

El Cachudito de cresta blanca es cuasi-endémico del Perú. Se encuentra desde el sur de Ancash hasta el norte de Chile (Fitzpatrick 2018). En Chile se encuentra muy restringido: Philippi et al. (1944) lo encontraron en el sector de Chinchorro en la ciudad de Arica, en 1943; Rottmann (1971) menciona un registro para Cuya; Lavercombe y Hill (1972) lo registran en el valle de Lluta y Marín et al. (1989) mencionan la captura de varios individuos en el valle de Camarones. Por ello, Jaramillo (2003) describe su distribución para toda la zona baja de la Región de Arica. Según la información de este Atlas, en Chile solo existe una población residente en el valle de Camarones, y registros aislados para el valle de Chaca. La especie actualmente no se encuentra presente en la ciudad de Arica, donde pudo experimentar extinción local debido a la urbanización.

Según Jaramillo (2003) se encuentra entre los 0–1.000 MSNM; el Atlas corrobora este mismo rango altitudinal dentro del valle de Camarones. En su rango total (incluyendo Perú) se encuentra hasta los 3.000 MSNM (Ridgely y Tudor 2009).

La información sobre su nidificación es muy escasa; en el Atlas se encontró evidencia de nidificación entre octubre y diciembre en tamarugos (*Prosopis* spp.). Estos nidos se encuentran a 2–5 metros sobre el suelo (F. Medrano obs. pers.). No hay más antecedentes.

Aparentemente no se encuentra amenazado (BirdLife International 2018), pero considerando su distribución restringida y su desaparición en Arica, podría presentar algún riesgo de extinción dentro del país. 🌱

Cachudito de cresta blanca

Anairetes reguloides

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES

Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com



METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

