

Chuncho del norte

Glaucidium peruanum

Fernando Angulo


CENTRO DE ORNITOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD (CORBIDI)

chamaepetes@gmail.com

El Chuncho del norte se distribuye por la vertiente occidental de Los Andes, desde el norte de la provincia de Manabí, en Ecuador, hasta el norte de Chile (Schulenberg y Batcheller 2012). En Chile, Goodall et al. (1951) señalan su presencia desde Arica hasta Caleta Buena, en la costa norte de Iquique, y Jaramillo (2003) amplía su distribución sur hasta el norte de la Región de Antofagasta. Autores posteriores lo sitúan por el sur hasta los oasis de Calama y del Salar de Atacama (Couve et al. 2016, Martínez y González 2017). En este Atlas se registró desde el valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota, hasta el sector de Camiña, Región de Tarapacá, aunque la modelación de probabilidad de presencia lo sitúa potencialmente hasta la costa y depresión central del norte de la Región de Antofagasta.

La especie ha sido descrita en Chile desde el nivel del mar hasta los 3.500 MSNM (Jaramillo 2003), pero en este Atlas lo encontramos solo entre los 300–2.700 MSNM, con la mayoría de los registros concentrados entre los 900–1.300 MSNM. La especie se encuentra restringida a oasis y valles andinos del norte, presentándose más comúnmente en áreas agrícolas con presencia de árboles grandes (Jaramillo 2003). En general, no se ha estudiado en detalle su comportamiento, siendo una especie en parte diurna. Se alimenta de invertebrados, anfibios, pequeñas aves y mamíferos, aunque existe poca información sobre su dieta (Schulenberg y Batcheller 2012).

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR



La reproducción de la especie también está poco estudiada (König y Weick 2008, Schulenberg y Batcheller 2012). Se ha descrito utilizando cavidades secundarias para nidificar, como nidos de Hornero de patas pálidas (*Furnarius leucopus*) y nidos de carpinteros excavados en árboles (König y Weick 2008). Sin embargo, y debido a la inexistencia de creadores de cavidades primarias en los valles del norte de Chile, el Chuncho del norte probablemente nidifique en murallas o riberas de ríos, como fue propuesto por König y Weick (2008).

Se ha descrito nidificando entre noviembre y mayo en la costa peruana y ecuatoriana, obteniéndose los siguientes registros: pichones a fines de febrero en Guayaquil (Ecuador); pichones recién emplumados a principios de enero en Piura (Perú) (Sanchez *com. pers.*); una hembra con parche de incubación y huevos en el oviducto, y un macho con la cloaca expuesta a mediados de noviembre en Arequipa (Perú) (Molina *com. pers.*); una pareja copulando a fines de marzo en Piura (Perú) (Morán *com. pers.*); y pichones a inicio de marzo en Chiclayo (F. Angulo *obs. pers.*).

Pese a que no se conocen estimaciones sobre su tamaño poblacional, en Chile podría existir cierto declive debido a la modificación de hábitat en los valles de la Región de Arica y Parinacota, principalmente en el valle de Azapa. 🌿

