

El Churrete costero es una especie endémica de Chile que se encuentra exclusivamente en zonas costeras desde Arica hasta Corral, Región de los Ríos, incluyendo la isla Mocha, Región del Biobío, siendo menos abundante de Arauco al sur (Goodall et al. 1946).

Los datos obtenidos en el Atlas son concordantes con la distribución conocida para el país. Se observó de manera continua desde la costa rocosa del sur de Arica hasta Punta Morguilla, al sur de Lebu, Región del Biobío, existiendo un vacío de datos en la Región de la Araucanía, y un único registro en Pilocura, costa de Valdivia, Región de los Ríos. Coincidente con lo señalado por Goodall et al. (1946), los registros al sur de la Región del Biobío presentan una densidad extremadamente baja, aunque su reproducción se considera probable hasta la costa de Valdivia.

Su hábitat se encuentra exclusivamente en el intermareal rocoso a lo largo de la costa, donde se alimenta de gusanos marinos, crustáceos, moluscos, insectos y algas (Goodall et al. 1946, Barros 1964), así como erizos de mar y peces pequeños (Remsen 2018).

Goodall et al. (1946) indican que empieza a nidificar en septiembre, y Barros (1946) señala polluelos en febrero. Los datos de este Atlas dan cuenta de alimentación de pichones entre septiembre y febrero.

Nidifica en cavidades entre rocas usualmente en promontorios y laderas inmediatas al mar, o bien en construcciones antrópicas, hasta a medio kilómetro alejado de la costa (Barros 1964). También puede construir sus propias cavidades en bancos de tierra en acantilados, siempre muy cerca de la costa (Goodall et al. 1946). El nido lo construye con hierbas, algas y líquenes, no muy cuidadosamente tejido (Barros 1964). Su tamaño de puesta usualmente es de 3-4 huevos, algo más grandes que los de otros *Cinclodes* (Goodall et al. 1946), y sus pichones son alimentados con pequeñas patas de jaibas y otros crustáceos y moluscos pequeños (Barros 1964).

Pese a que no se encuentra amenazado, su hábitat se encuentra escasamente representado en el SNASPE. Se recomienda la protección del intermareal rocoso para asegurar su reproducción.

A pesar de que el Churrete costero se distribuye ampliamente a lo largo de la costa de Chile, siendo bastante común y fácil de localizar en su hábitat, son muy poco conocidos muchos aspectos de su historia natural, biología de la reproducción y su dieta de la orilla del mar (Schulenberg y Jaramillo 2011). 🌿

Churrete costero *Cinclodes nigrofumosus*

André Vielma

ONG TARUKARI

avielmam@gmail.com

