

## Cometocino de Arica

*Idiopis erythronotus*

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES  
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROCV)

fernandomedranomartinez@gmail.com



*El Cometocino de Arica* presenta una distribución restringida, en la cordillera del extremo sur de Perú, el extremo norte de Chile y parte de Bolivia (Jaramillo 2018). En Chile fue descrito tempranamente por Hellmayr (1932) para Las Cuevas, en el Parque Nacional Lauca, Región de Arica y Parinacota. Goodall et al. (1946) lo señalan para el extremo norte de la Región de Arica y Parinacota, mencionando el sector de Quebrada larga (entre Putre y Parinacota) y que probablemente se encuentre también en Tarapacá. Philippi-B (1964) también lo menciona en Choquelimpie, dentro del Parque Nacional Lauca. En este Atlas se registró en el Parque Nacional Lauca y en el Monumento Natural Salar de Surire.

En cuanto a la distribución altitudinal, Araya (1986) lo describe sobre los 4.000 MSNM y Jaramillo (2003) entre los 3.800–4.500 MSNM. Mientras que en el Atlas se encontró entre los 4.200–4.600 MSNM.

Presumiblemente se reproduciría entre marzo y mayo (Fjeldså y Krabbe 1990). En el Atlas se encontraron adultos alimentando pichones en enero (M. Garrido en *eBird* 2016). No hay más información sobre su reproducción.

No se encuentra globalmente amenazado (BirdLife International 2018), aunque no existe información certera sobre sus tamaños y tendencias poblacionales. 🌿

### METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

