Dormilona de nuca rojiza
Muscisaxicola rufivertex

Víctor Bravo-Naranjo
LABORATORIO ECOLOGÍA DE VERTEBRADOS
UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS)
vbravo.ceanor@gmail.com

Ivo Tejeda
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
ivonicolas@gmail.com

La Dormilona de nuca rojiza se distribuye a través del alzamiento de la Cordillera de los Andes en el noroeste del Perú, este de Bolivia, noroeste de Argentina y norte de Chile continental.

Se reconocen dos subespecies, ambas presentes en Chile. *M. r. rufivertex* se ha descrito como reproductura en la Cordillera de los Andes desde Atacama hasta la Región de O'Higgins, desplazándose durante el otoño e invierno a la costa entre Antofagasta y Coquimbo (Goodall *et al*. 1946); sin embargo, en ocasiones se ha señalado solo hasta el norte de la Región de Coquimbo (Jaramillo 2003). Este taxa también alcanza Argentina, aunque solamente en la provincia de Mendoza (Darrieu y Segura 2015). En tanto, *M. r. pallidiceps* se extiende por Perú, Bolivia y Argentina, encontrándose en Chile desde Arica y Parinacota hasta Antofagasta, cerca de los 1.000 MSNM, y hasta alturas de 4.000 MSNM (Goodall *et al*. 1946). En Argentina se han descrito movimientos luego de la temporada reproductiva, hacia el norte y zonas más bajas (800 MSNM) (Capllonch 2007). En Chile sus movimientos no han sido estudiados, aunque Martínez y González (2017) sugieren que solo realiza desplazamientos altitudinales, permaneciendo en el país todo el año.

El modelamiento propuesto coincide en la mayor parte del rango de distribución descrita previamente, reflejando las zonas de reproducción de ambas subespecies. En el caso de *rufivertex*, en los Andes desde el centro de Atacama hasta la Región de O'Higgins y con una menor probabilidad en el Maule, donde existe un registro en temporada reproductiva, posterior al periodo de este Atlas cerca de la laguna El Planchón (D. Imbernón *en eBird 2018*). Por su parte, *pallidiceps* se distribuye en zonas altas desde Arica y Parinacota hasta Antofagasta, con presencia también en zonas de menor altura, bajo los 1.000 MSNM. Aunque se considera también una distribución cercana a la costa, que probablemente se deba a algunos ejemplares que permenecen allí todo el año, sin reproducirse.

La Dormilona de nuca rojiza prefiere zonas abiertas y semiabiertas con baja cobertura vegetal, aunque también es posible avistarla en sectores cercanos a zonas húmedas. Se alimenta de insectos y bayas; además, cuando migra hacia zonas costeras también busca pequeños crustáceos marinos (Goodall *et al*. 1946).

Goodall *et al*. (1946) señalan que *M. rufivertex* nidifica en la alta cordillera durante la temporada de verano, ocultando el nido en cavidades localizadas en paredes de roca, pircas o muros de piedras, sin mencionar muchos más detalles. Los datos de este Atlas dan cuenta de despliegues desde septiembre en el norte de la Región de Atacama, los que podrian corresponde al límite de la distribución de *M. r. rufivertex* (en la Ruta La Puerta-Portezuelo Sta Rosa); no hay más información.



En cuando a *pallidiceps*, pese a que en Chile su reproducción es prácticamente desconocida, en Argentina existen numerosas descripciones de sus hábitos reproductivos, todas en Pampa de Achala (provincia de Córdoba). Salvador y Narosky (1983) encontraron nidos construidos con paja, hierba, raicillas, tallos, inflorescencias, líquenes y musgos, los que son dispuestos de forma irregular; uno de ellos estaba parasitado por *Molothrus bonariensis*. Salvador y Salvador (2012) dan cuenta de 8 nidos, con una postura que varió entre 2 y 3 huevos, la mayoría en grutas de rocas, pero también en pircas y refugios de piedras en forma de semiesfera. Estos nidos estaban compuestos principalmente de «gramíneas, pajitas y tallos muy delgados, interiormente revestidos con plumas, pelos y cerdas». La alimentación de los pichones estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.

De acuerdo a la temporalidad de postura para este taxa, los registros indican que principalmente se concentraría entre los meses de noviembre y enero (Narosky y Salvador 1988, Miatello *et al*. 1999, de la Peña 2005, Salvador y Salvador 2012, de la Peña 2013), lo que concuerda con los registros de este Atlas, donde hubo alimentación de pichones en febrero en el salar de Carcote, al norte de la Región de Antofagasta; y volantones en el salar de Llamara en enero, en la Región de Tarapacá, sugiriendo reproducción también en zonas más bajas para *M. r. pallidiceps* en el norte de Chile, a 800 msnm aproximadamente (F. de Groote y T. Valle *en eBird* 2013).

La Dormilona de nuca rojiza tiene un rango de distribución extremadamente grande, y a pesar de que el tamaño de su población mundial no ha sido cuantificado, no existen investigaciones que den cuenta de su disminución, por lo que la especie se encuentra evaluada como de ‹preocupación menor› (BirdLife International 2018).