

Pimpollo tobiano
Podiceps gallardoi

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

Sharon Montecino
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
sharonmontecino@gmail.com

El Pimpollo tobiano es considerado un nidificante endémico de Argentina, y una de las aves más amenazadas de aquel país (Roesler et al. 2012), siendo clasificado como «EN PELIGRO CRÍTICO» (BirdLife International 2018). Aunque ha sido considerado como un ave errante en Chile (Barros et al. 2015), Roesler (2015) plantea la posibilidad de que los registros ubicados entre Puerto Natales y Torres del Paine (Región de Magallanes) sean aves que podrían nidificar en el país. Por ello, Roesler (2015) señala que es necesario generar monitoreos dirigidos en algunos sectores como la laguna Goic y la laguna Los Blanquillos, ya que además de la ocurrencia reiterada de individuos, presentan características similares a sitios reproductivos de latitudes cercanas. De forma complementaria, Roesler (2016) señala que la fluctuación de sus poblaciones en el área de distribución estival por el desecamiento de lagunas podría suponer, eventualmente, una dispersión de individuos hacia zonas más húmedas en busca de condiciones idóneas para la nidificación. Al respecto, Donoso et al. (2015) demostraron la permanencia de la especie en Magallanes durante al menos dos periodos estivales. Otro sector donde podría eventualmente nidificar es en las lagunas al límite de la provincia de Capitán Prat (Región de Aysén) con Argentina, lo cual se encuentra a escasos kilómetros de sus sitios de reproducción conocidos en ese país. El hecho de ser una especie críticamente amenazada vuelve imperioso conocer su estado poblacional en Chile; definirlo, y quizás detectar eventos de nidificación, lo que dependerá de impulsar prospecciones en las regiones señaladas y maximizar monitoreos en lagunas que reúnan las condiciones necesarias para su reproducción, como lo es el desarrollo del «Vinagrillo» (*Myriophyllum elatinoides*), planta acuática sobre la cual nidifican. 🌿

Picaflor azul
Colibri coruscans

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

El Picaflor azul fue descubierto en Chile en el invierno de 1985 en Mamiña por Luis Peña (Marín et al. 1989). Dichos autores sugieren que la especie es residente (por la fecha del hallazgo), y describen que este registro expande en 580 kilómetros la distribución conocida hacia el sur desde los Andes peruanos. Posteriormente, Estades (1992), Salaberry et al. (1992) y Howell y Webb (1995) lo describen en Putre y Socoroma. La literatura posterior lo ha tratado como una especie regular en Chile, señalándose su preferencia por sitios con cobertura vegetal y con eucaliptos (*Eucalyptus* spp.) (Kuzmicic 2015). A la fecha, no se han encontrado evidencias de la reproducción de la especie, aunque se encuentra durante todo el año, por lo que es probable que la especie pueda estar reproduciéndose en el país, aunque los nidos sean poco conspicuos. Esta especie es más abundante en Socoroma que en otros sitios aparentemente por la presencia de Eucaliptos en este lugar (Kuzmicic 2015), transformándolo en una localidad interesante para buscar su reproducción. 🌿