

La Fardela chica se presenta en aguas subantárticas, nidificando el taxón *elegans* en el archipiélago Tristan da Cunha e isla Gough (Atlántico sur), en las islas Chatham y Antípoda (Pacífico sur), y posiblemente en la isla San Pablo (Índico sur), con algunos registros frente a las costas de Chile, lo que podría corresponder a una desconocida población reproductora (del Hoyo et al. 2018). En Chile, Jehl (1973) la registró por primera vez frente a Chiloé, en junio de 1970, capturando machos con testículos agrandados, lo que sugería que no se encontraría lejos una colonia de nidificación, proponiendo a las islas de Chiloé y Guafo como sitios probables. Con pocas observaciones reportadas, Jaramillo (2003) señala que aparentemente es más regular en invierno frente a las costas chilenas. En los últimos 10 años se ha reportado en pocas oportunidades: al norte de Chiloé en marzo 2009 (J. Ruiz *in litt.*), en el Golfo de Corcovado en marzo 2010 (J. Plana en Barros y Schmitt 2015), en febrero de 2012 en la isla Metalqui, Chiloé (C. Vidal en Barros y Schmitt 2015), y en los alrededores de isla Guafo en marzo 2016 (F. Schmitt en *eBird* 2016). Pese a no existir mayor evidencia de reproducción, parece interesante una búsqueda de esta especie y sus eventuales colonias en otoño-invierno, en las islas señaladas por Jehl (1970), quien caracteriza la especie como reproductora de invierno. 🌿

Fardela chica

Puffinus asimilis elegans

Rodrigo Barros

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

barrilo@gmail.com

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com

La Golondrina de mar Pincoya es una de las aves marinas menos conocidas a nivel mundial. Fue descrita recién el año 2013 por Harrison et al. (2013), en base al reporte de golondrinas de mar no identificadas de O'Keeffe et al. 2009. El SACC la ha considerado recientemente una especie válida, sin embargo, su estatus no ha estado exento de polémicas (véase propuesta 721 en Remsen et al. 2018), debido a la existencia de individuos con plumajes intermedios entre esta especie y *O. oceanicus chilensis*, lo que dificulta su identificación en el campo (Howell y Schmitt 2016). Su distribución en el mar no ha sido bien delimitada, pero al menos se encontraría desde el seno de Reloncaví, Región de los Lagos (donde fue descrita), hasta el Golfo de Corcovado en la Región de Aysén (Howell y Schmitt 2016).

Golondrina de mar Pincoya

Oceanites pincoyæ

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com

Aún no se conoce la zona donde se reproduce, siendo prioritaria su búsqueda. Harrison et al. (2013) plantean que los sitios podrían estar entre el seno de Reloncaví y Chiloé, pero que no se pueden descartar las montañas del sector, especialmente porque existen registros de ejemplares caídos en el sector de El Bolsón, Argentina. Se ha planteado que es un taxón aislado, con *O. gracilis* nidificando por el norte y *O. o. chilensis* por el sur (Harrison et al. 2013), aunque a la luz de nuevos hallazgos *O. o. chilensis* aparentemente también nidifica en la cordillera de la zona central de Chile (Barros 2017).

Rodrigo Barros

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

barrilo@gmail.com

Harrison et al. (2013) especularon, en base a la muda, que la especie probablemente arriba a sus colonias la primera quincena de octubre, pondría sus huevos a mediados de noviembre y sus pichones dejarían el nido la segunda quincena de febrero.

Al conocerse solo en un área restringida de Chile, existen algunas amenazas potenciales para la especie, como accidentes que involucren derrames de petróleo en el Seno de Reloncaví, o la existencia excesiva de plásticos generados por la industria salmonera, la que puede generar residuos ingeridos por la especie. Sin embargo, es prioritario entender sus amenazas (de existir), para plantear formas de mitigarlas. 🌿