

Pilpilén común
Hæmatopus palliatus

Rodrigo Barros
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
barrilo@gmail.com


El *Pilpilén común* se encuentra en el borde costero de América del Norte y del Sur, reconociéndose dos subespecies. La subespecie *palliatus*, que se distribuye por el Pacífico, desde el Golfo de California hasta el centro de Chile, y por el Atlántico, desde Massachusetts al sur de Argentina, incluyendo las islas del Caribe; y la subespecie *galapagensis*, circunscrita a las islas Galápagos (Hockey y Kirwan 2018).

En Chile, Goodall *et al.* (1951) la sitúan por toda la costa, desde Arica hasta Chiloé, siendo reemplazada desde Chiloé al sur por el Pilpilén austral (*Haematopus leucopodus*). Esta distribución es repetida por autores posteriores (Philippi-B 1964, Johnson 1965, Araya y Millie 2000). Venegas (1973) reporta por primera vez su presencia en la Región de Magallanes, a partir de ejemplares colectados y observados en las cercanías de la primera angostura del Estrecho de Magallanes, vinculándolos con la población del Atlántico, siendo un visitante regular de verano en la zona (Venegas y Jory 1979).

En la temporada del Atlas se reportó de manera continua desde el límite con Perú hasta la isla de Chiloé, y por el continente, hasta el borde sur de la Región de los Lagos; en la Región de Aysén se reportaron observaciones de un ejemplar en la laguna San Rafael (G. Gómez, C. Pinto, R. Reyes, R. Tapia *en eBird* 2013); y en la Región de Magallanes se informó de manera regular en el borde norte del Estrecho de Magallanes, con algunos reportes para bahía Lomas (Tierra del Fuego) y para el área de Puerto Natales. Se confirmó reproducción desde Arica hasta la isla de Chiloé, además del Estrecho de Magallanes.

El Pilpilén común es estrictamente costero, encontrándose muy asociado con playas de arena y estuarios fangosos, a menudo en las zonas altas de arena seca (Jaramillo 2003). Se alimenta de ostras y otros moluscos que busca en los bajos y rocas de la costa (Goodall *et al.* 1951)

La postura comienza en octubre, prolongándose a veces hasta diciembre (Goodall *et al.* 1951). Housse (1945) señala nidos con huevos en noviembre y diciembre. En la Región de Magallanes nidifican a principios de noviembre (Venegas y Jory 1979). En la temporada del Atlas se reportaron nidos activos (ocupados o con huevos) entre agosto y enero para la Región de Arica y Parícuta, entre octubre y febrero para la Región de Valparaíso, y a partir de noviembre en la Región de los Lagos. Para la Región de Magallanes se informó de parejas con polluelos en noviembre.



Nidifica generalmente en las dunas a pocos metros de la playa, escogiendo de preferencia los lugares donde hay piedrecillas o conchuelas, siendo el nido una simple depresión en el suelo, donde los huevos se mimetizan con el entorno (Goodall *et al.* 1951). La nidada es de 2-3 huevos, de color piedra con pintas y manchas negras (Goodall *et al.* 1951). En la temporada del Atlas se reportaron nidos con 1-3 huevos. La incubación es de 24-29 días, emplumando los polluelos a los 32-50 días, siendo el éxito de reproducción de entre 0,24-0,39 polluelos por pareja al año (Hockey y Kirwan 2018).

A nivel global el Pilpilén común es clasificado como de «PREOCUPACIÓN MENOR» (BirdLife International 2018). No obstante aquello, el desarrollo en algunas zonas de playas en Norteamérica ha reducido la disponibilidad de sitios de nidificación y ha conducido a cambios locales en la distribución, así como a una probable disminución general de la población (Hockey y Kirwan 2018). Algo similar ocurre en Chile, donde las zonas de playa y dunas costeras son fuertemente presionadas por el desarrollo inmobiliario, destruyendo áreas potenciales de nidificación, lo que sumado a la presencia de perros, perturbación humana y vehículos motorizados, estarían impactando fuertemente el éxito reproductivo de algunas poblaciones. Un ejemplo de lo anterior es lo evaluado en la temporada 2008–2009 en la extensa playa entre Quintero y Mantagua, Región de Valparaíso, (una de las más importantes para la reproducción de la especie en el litoral de Chile central), donde se censaron entre 50-60 parejas, sin que aparentemente sobreviviera ningún pichón en dicha temporada (Censo Perrito-Pilpilén *in litt.*). Es urgente monitorear las poblaciones chilenas del Pilpilén común para evaluar su dinámica poblacional en el país y tomar medidas de conservación efectivas. Al respecto Walther *et al.* (2017) estimaron una población de 38.310 individuos para la población entre Arica y la isla de Chiloé. 🌿

