

Tenca de alas blancas
Mimus triurus

Matías Garrido
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
matias.garrido@uv.cl

Rodrigo Barros
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
barrilo@gmail.com


La *Tenca de alas blancas* se distribuye por Argentina desde el norte por Jujuy y Salta hasta Chubut por el sur. Adicionalmente realiza movimientos migratorios invernales que se extienden hacia el oeste de Bolivia, Paraguay, centro-oeste, sur y sureste de Brasil, siendo accidental en Perú (eBird 2018).

Aunque inicialmente no era considerada como parte de la avifauna chilena, Reed la incluye en la lista de las aves de Chile en 1896 (Goodall et al. 1946). Su distribución en nuestro país se estableció entre Santiago y Valdivia (Hellmayr 1932). Posterior a registros en la Región de Atacama por Millie se extiende su rango hacia la zona norte (Goodall et al. 1946). Jaramillo (2003) plantea que se podría registrar desde el extremo norte hasta Los Lagos, lo cual es confirmado en revisiones posteriores (Azócar y Pinto 2014, Barros y Schmitt 2015). Adicionalmente, Martínez y González extienden la distribución de los registros en Chile desde Arica a Aysén (Martínez y González 2017)

En los países vecinos su distribución altitudinal se da principalmente bajo los 500 msnm, mencionándose que puede alcanzar alturas considerables en el periodo no-reproductivo en Bolivia y Chile (Ridgley y Tudor 2009, Cody y Kirwan 2018). Se cita que para Mendoza (Argentina) se reproduce a 2.600 msnm (Fjeldså y Krabbe 1990). En Chile se ha registrado alcanzando el nivel del mar en varios puntos (eBird 2018), hasta los 4.345 msnm en Laguna Verde, Atacama (D. Hiriart en eBird 2017).

Allende los Andes habita principalmente zonas de matorral no-desértico, bosques chaco y de monte, sabanas y estepas. Puede utilizar lugares alrededor de habitaciones humanas (Fjeldså y Krabbe 1990, Ridgley y Tudor 2009, Cody y Kirwan 2018). En Chile se le ha registrado en una variedad de hábitats incluyendo áreas verdes urbanas, zonas abiertas, bordes de humedales costeros y altoandinos, bosque esclerófilo, matorrales, desierto, borde costero y estepa altoandina (eBird 2018).

La temporada reproductiva descrita para la tenca de alas blancas incluye los meses de noviembre y diciembre (Fjeldså y Krabbe 1990, Cody y Kirwan 2018). El macho realiza un despliegue en el cual corre y salta en el suelo, mientras mantiene sus alas y cola abierta mostrando las áreas blancas de su plumaje, colocando su cuerpo en posición casi horizontal para luego dejarse caer y correr unos pasos más, continuando casi un minuto (Fjeldså y Krabbe 1990). El nido es una estructura abierta de ramitas, relleno con fibras vegetales, flores y raíces. Éste se localiza en la vegetación baja, comúnmente en un arbusto espinoso. Pone 3–4 huevos (Fjeldså y Krabbe 1990).



Goodall señala que se han creído encontrar nidos de la tenca de alas blancas en dos o tres ocasiones, sin poder ser comprobado (Goodall et al. 1946). Por ejemplo, mencionan que en la localidad de Hornitos en el valle del río Copiapó, Región de Atacama, encontraron un nido en noviembre con aspecto similar al de la tenca, pero con huevos más pequeños, cuyas medidas se corresponden con las que dan los autores argentinos a la tenca de alas blancas (Philippi et al. 1944). Fjeldsâ también plantea la duda si puede reproducirse en Chile (Fjeldsâ y Krabbe 1990). Una posibilidad puede ser la observación de ejemplares en relación a nidos abandonados de otras especies, como lo descrito durante el periodo del Atlas en el cual un ejemplar se posa sobre un nido y empieza a cantar fuera de época reproductiva en Antofagasta (C. Moreno en eBird 2013). Couve et al. afirman nidificación en el sector de Camar, Antofagasta (Couve et al. 2016).

En enero de 2018 es encontrado un nido de tenca de alas blancas al oeste del Salar de Atacama en la Región de Antofagasta, a 2.773 MSNM. Dos adultos realizaban visitas frecuentes al nido que estaba ubicado en un algarrobo a 2 metros de altura, construido con ramas del mismo. En visitas posteriores al lugar se ha vuelto a registrar ejemplares de esta especie (G. Alfsen en eBird 2018, G. Alfsen com. pers. 2018). La existencia de una población eventualmente reproductora residente en Bolivia, Paraguay y norte de Argentina podría explicar la expansión, colonización y reproducción de la tenca de alas blancas en el norte de Chile (Schulenberg 2018). Con este hallazgo se confirma su nidificación en nuestro país.

La revisión de la literatura previo al periodo de este Atlas daba cuenta de 22 registros (Marín 2004, Barros y Schmitt 2015). Durante el periodo de recolección de datos del Atlas se registraron 47 individuos distintos de tenca de alas blancas y posteriormente contamos con 36 nuevos registros en dos años (eBird 2018). Creemos que su estatus más apropiado para Chile parece ser el de visitante regular escaso con una población residente reproductora en la cordillera de la Región de Antofagasta. Para la próxima edición del Atlas deben buscarse nuevas evidencias de reproducción que confirmen la colonización y expansión de la tenca de alas blancas, particularmente en la cordillera desde Tarapacá a Atacama. 🌿

