Pato juarjual

Lophonetta specularioides

† Sergio Salvador
CÓRDOBA, ARGENTINA

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

El Pato juarjual está representado por dos subespecies que se distribuyen entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En Chile, la subespecie *alticola* ha sido descrita en la literatura desde el extremo norte, en Visviri, hasta la cordillera de la Región del Maule, mientras que *specularioides* ha sido descrita desde la cordillera de la Región del Maule hasta el Cabo de Hornos (Johnson 1965, Carboneras 2018, Carboneras y Kirwan 2018), lo cual ha sido debatido por Couve *et al*. (2016), quienes plantean que *alticola* se encuentra desde Visviri hasta la Región de los Ríos, y *specularioides* en la Patagonia chilena. En el mapa de este Atlas se visualiza una distribución continua de esta especie entre Visviri y la Región de los Lagos, con sectores aptos en la Región de los Ríos, y apareciendo nuevamente en la Región de Aysén, teniendo una mayor probabilidad de presencia en el altiplano y en la Región de Magallanes, lo cual podría apoyar la distribución propuesta por Couve *et al*. (2017).

Su distribución altitudinal ha sido descrita desde el nivel del mar hasta los 4.700 MSNM (Jaramillo 2003); en este Atlas lo encontramos entre el nivel del mar y los 5.400 MSNM.

El Pato juarjual habita lagunas, lagos, arroyos, ríos, vegas andinas, y aunque en el norte de su distribución solo es registrado en costas marinas de forma casual, en Patagonia puede presentarse también en ellas. Hace su nido en una depresión en suelo seco, que tapizan con tallos y hojas de gramíneas y otras herbáceas, y forran con abundante plumón de la misma ave (diámetro total 26–40 cm, diámetro interno 16–25 cm y profundidad 6–10 cm); se encuentran ocultos por gramíneas o hierbas, en las proximidades de lagunas (S. Salvador *obs. pers.*).



La temporada reproductiva de la especie en Chile comenzaría entre septiembre y marzo, y podría realizar dos posturas por temporada (Goodall *et al*. 1951, Fjeldså y Krabbe 1990). En este Atlas se registró actividad reproductiva entre agosto, con cortejos y cópulas a lo largo de su distribución, hasta marzo, donde hubo pichones. La postura es de 5–8 huevos que miden 58,6–67,4×38,5–45,1 mm y pesan 50–65 gr (Johnson 1965, Woods y Woods 1997, Salvador 2015). En este Atlas se registraron parejas con entre 3–8 pichones, lo cual corrobora el tamaño máximo de puesta de la especie.

Solo la hembra incuba, pero los pichones son cuidados por ambos miembros de la pareja. Al eclosionar los pichones pesan entre 43–56 gr A las pocas horas de nacidos (con la orientación principalmente de la hembra) los pichones se alimentan por su cuenta; su alimento principal es de origen vegetal, algas, pequeñas semillas, tallos y hojas de plantas acuáticas, suplementando su dieta con larvas de insectos, crustáceos y moluscos (S. Salvador *obs. pers.*).

El Pato juarjual fue caracterizado en 2012 como en ‹PREOCUPACIÓN MENOR› y su población es considerada estable (BirdLife International 2018).