Pato rana de pico ancho

Oxyura jamaicensis


† Sergio Salvador
CÓRDOBA, ARGENTINA

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

El Pato rana de pico ancho es uno de los Anatidæ con la mayor distribución en el continente americano, ya que con sus tres subespecies, se la encuentra desde Alaska y el norte de Canadá hasta Tierra del Fuego (Carboneras 1992, Carboneras y Kirwan 2018). La subespecie *ferruginea* habita en el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta la Patagonia de Argentina y Chile (Carboneras 1992, del Hoyo *et al*. 2016). En Chile se distribuye desde Arica y Parinacota hasta Tierra del Fuego (Philippi-B 1964). Sin embargo, según el mapa de este Atlas dicha distribución no es homogénea, encontrándose principalmente en el altiplano entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, apareciendo nuevamente como especie regular en la cordillera de la Región de la Araucanía, y estando regularmente hasta Torres del Paine (Región de Magallanes). También fue registrada en Tierra del Fuego, donde es escasa.

En cuanto a la distribución altitudinal, Jaramillo (2003) lo indica entre los 0–4.600 MSNM, la cual coincide plenamente con la distribución encontrada en este Atlas.

El Pato rana de pico ancho habita lagunas, lagos, embalses, bañados y arroyos; aunque su preferencia son lagunas poco profundas con abundante vegetación palustre. Construye su nido en lagunas con cobertura de juncos, totoras y otras plantas acuáticas. Sus nidos son voluminosos y en ocasiones muy bien elaborados con una cubierta de tallos y hojas de juncos, gramíneas y otras herbáceas, y forrados con plumón de la misma ave (diámetro 26–40 cm y profundidad 8 cm).



La temporada reproductiva reportada en la literatura se extiende en Chile entre septiembre y enero (Johnson 1965), sin embargo, los datos de este Atlas muestran que el cortejo y las cópulas se inician en agosto y se pueden encontrar pichones hasta febrero. La nidada consta de 5–12 huevos, en ocasiones hasta 15, los cuales miden 68,0–74,5×51,0–52,9 mm y pesan 101–108 gr (Johnson 1965, Carboneras 1992, Casas 1992, de la Peña 2013, Moroni y Salvador 2014).

Solo la hembra incuba, pero los pichones son cuidados por ambos miembros de la pareja. A las pocas horas de nacidos, y con la orientación principalmente de la hembra, los pichones se alimentan por su cuenta; su alimento principal es de origen vegetal, pequeñas semillas, algas, tallos y hojas de plantas acuáticas, suplementando su dieta con pequeños artrópodos (S. Salvador *obs. pers.*).

El Pato rana de pico ancho fue caracterizado (sin discriminación de subespecies) en 2012 como en ‹PREOCUPACIÓN MENOR›, sin embargo su población es considerada decreciente (BirdLife International 2018).

