

**Tagua de frente roja**  
*Fulica rufifrons*

**Daniel González-Acuña**  
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS  
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  
DANIGONZ@UDEC.CL


**Carolina Silva-de la Fuente**  
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS  
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  
silva.delafuente@gmail.com

*La Tagua de frente roja* está presente en Sudamérica, encontrándose en Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, el sur de Brasil y Chile. En Chile, su distribución se extiende desde el río Copiapó hasta Chiloé (Philippi 1964), con registros accidentales en Magallanes (Couve y Vidal 2003) e isla Robinson Crusoe (Araya y Millie 2000). En la Región de Atacama es preferentemente costera. Martínez y González (2017) informan de registros en los Andes centrales a 2.600 y 3.000 MSNM, sin embargo, en este Atlas todos los registros están bajo los 1.200 MSNM.

Su hábitat incluye lagos y lagunas abiertas de agua dulce con abundante vegetación emergente y juncuales en sus orillas (Couve y Vidal 2003, Martínez y González 2004). En Chile es común observarla en los bordes de los charcos y estratos de hierbas (Cody 1970), también en estuarios, esteros y lagunillas estacionales.

Arballo y Cravino (1999) han registrado el inicio de la temporada reproductiva (cortejo) a partir de fines de septiembre en el lago de las Canteras del Parque Rodó, Montevideo (Uruguay). En Chile, Goodall *et al.* (1951) registra para *F. rufifrons*, así como para *F. armillata*, el inicio del periodo de postura a comienzos de octubre y el final de este periodo en noviembre, pudiendo prolongarse hasta diciembre o enero. Observaciones realizadas en Valdivia por Ruiz (1993), señalan que el periodo reproductivo se extiende desde septiembre a marzo, con un aumento en la actividad de nidificación y postura durante los meses de noviembre, diciembre y enero.

Es una especie muy adaptable en la selección del sitio de nidificación. Utiliza la vegetación densa adyacente a charcas pequeñas o vegetación escasa que tiene pocas aberturas (Weller 1967<sup>a</sup>). Fabrica un nido compuesto de juncos secos entrecruzados siguiendo un patrón circular, con una taza poco profunda (Silva *et al.* 2011). Generalmente es un nido bien oculto, anclado en la emergente vegetación o construido en la vegetación flotante presente en el agua baja (Arballo y Cravino 1999). Es un nido algo pequeño para su género, con diámetro externo de 25 cm, alto 25 cm, y profundidad de la copa de 6 cm. La altura media del nido con respecto al espejo de agua es de 17,7 cm. El nido en algunos casos tiene rampa de acceso (Silva *et al.* 2011). Ocasionalmente anida fuera del agua sobre terreno sólido (Martínez y González 2017). Un caso inusual, reportado por Silva *et al.* (2011), detalla un nido de Tagua de frente roja construido sobre un sauce (*Salix* sp.) a 24 cm del espejo de agua. La postura es en promedio de 6,3 huevos por nido (rango de 4–8) (Silva *et al.* 2011).



En Montevideo se ha determinado un periodo de incubación de 25 días (Escalante 1991), y para el centro-sur de Chile 26 días (Silva et al. 2011).

Prefiere el interior de la vegetación emergente, juncales (*Schoenoplectus californicus*) y totorales (*Typha dominguensis*) (Arballo y Cravino 1999). Este último sitio al parecer es el más conveniente, ya que aunque es cerrado, no dificultaría su desplazamiento, en el cual se vale de su cuerpo comprimido y sus dedos con estrechas membranas (Escalante 1991). Casi nunca se aleja de los bordes de la mencionada vegetación, y no es común verla en aguas abiertas, aunque suele alimentarse en lugares donde crece vegetación sumergida o a nivel del agua (Arballo y Cravino 1999).

Cody (1970), registró en Chile que un 78% de las taguas de frente roja se alimentaron en la superficie del agua, 11% sumergiendo la cabeza y el 11% zambulléndose. Según estudios realizados por Ruiz (1993) en el río Cruces (Valdivia), su dieta incluye una alta diversidad de vegetales, resaltando el Rime (*Eleocharis pachycarpa*), Luchecillo (*Egeria densa*), Pata de lobo (*Lycopus europæus*) y algunas gramíneas. También los insectos están presentes en la dieta de los adultos, constituyendo un porcentaje importante. Este mismo estudio demuestra solo un 29% de similitud de la dieta entre esta especie y la Tagua común (*Fulica armillata*).

La Tagua de frente roja es víctima del parasitismo del Pato rinconero (*Heteronetta atricapilla*) (Goodall et al. 1951). Además, las actividades humanas intensivas tales como explotación forestal, extracción de huevos, acumulación de sustancias agroquímicas o de residuos industriales, sumado a drenaje de humedales, produce deterioro de ambientes donde esta ave se desenvuelve. 🌿

