Tagüita común
Porphyriops melanops

Patrich Cerpa
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
INSTITUTO DE ENTOMOLOGÍA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE)
patrichcm@gmail.com

La Tagüita común se distribuye en Sudamérica con tres subespecies que presentan poblaciones separadas: *bogotensis*, en el este de los Andes de Colombia; *melanops*, en el sureste de Bolivia, Paraguay, este y sur de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina; y *crassirostris*, en Chile y suroeste de Argentina (Taylor y Kirwan 2018). Para Chile, Goodall *et al*. (1951) la mencionan entre el valle del río Copiapó (Región de Atacama) hasta Chiloé (Región de los Lagos); Johnson (1965) extiende esta distribución a la Región de Aysén, lo que se repite en la literatura posterior (*e.g*. Araya y Millie 2000, Jaramillo 2003, Martínez y González 2017). Altitudinalmente Jaramillo la sitúa entre los 0-700 MSNM. Recientemente se registró un ejemplar al sur de Machuca, cordillera de la Región de Antofagasta, a 4.000 MSNM (S. Imberti *en eBird 2018*).

En el período del Atlas se obtuvieron registros desde el valle del río Copiapó hasta Chiloé, Región de los Lagos, aunque el modelo de distribución sugiere que existe hábitat potencial en el norte de la Región de Aysén, por lo que sería interesante su búsqueda en dicha zona. Altitudinalmente se reportó entre los 0-1.600 MSNM, aunque la mayoría de los registros se realizó bajo los 400 MSNM.

Siempre asociada a cuerpos de agua principalmente lénticos es común de observar entre totoras y juncos en tranques, parques con estanques, lagunas, zonas bajas de lagos o aguas tranquilas de ríos y esteros (Bullock 1930, Bullock 1935). En estos lugares se alimenta principalmente de semillas de gramíneas, insectos, arácnidos, moluscos dulceacuícolas y terrestres (Marelli 1919, Housse 1925, Zotta 1936, Sarrías *et al*. 1996, Olguín 2012)



Según Goodall *et al*. (1951), la postura de huevos ocurre entre octubre y noviembre; Castro (1994) informa reproducción en Batuco, Región Metropolitana, entre octubre y febrero; mientras en Argentina, de la Peña (1987) señala este periodo desde noviembre a enero. En el presente Atlas se obtuvieron registros de huevos a partir de octubre, mientras que la presencia de pichones se concentró desde octubre hasta marzo, con el registro de los últimos volantones hasta abril.

Anida en los mismos ambientes previamente descritos, colocando el nido por lo general en el suelo en partes húmedas, ligeramente por encima del agua, o adheridos a troncos en estos lugares, pero siempre cubiertos y ocultos con la densa vegetación circundante; allí construye un nido de gramíneas, juncos y otros restos vegetales, el que lleva una especie de semi-techo. Deposita entre 4 y 8 huevos de color crema con manchitas irregulares más oscuras (Smyth 1928, Goodall *et al*. 1951, de la Peña 1987, Castro 1994, Taylor y Kirwan 2018). No existe mayor información.

Respecto a sus depredadores, Housse (1937) menciona que el Peuquito (*Accipiter bicolor*) da caza a esta especie, sin embargo, en la actualidad seguramente se ve asediada por especies invasoras como perros y visones que regularmente visitan humedales en búsqueda de presas.

La especie se encuentra categorizada como ‹PREOCUPACIÓN MENOR› por la IUCN por su amplia distribución y aparente estabilidad de las poblaciones (BirdLife International 2018). Sin embargo, las condiciones en el país para los ambientes que pueden ser considerados como hábitats para la especie se encuentran en evidente disminución y seriamente amenazados, producto del secado de humedales.