

Vencejo chico
Aeronautes andecolus

Juan Aguirre
AVESCHILE
jeac616@gmail.com

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com



El vencejo chico se encuentra desde el centro de Perú, pasando por Bolivia, el norte de Chile y llegando hasta el centro-oeste de Argentina en el área de Mendoza (Chantler y Boesman 2018). En Chile, Hellmayr (1932) lo describe para Chacalluta (en la frontera con Perú), y luego Philippi et al. (1944) lo encuentran a lo largo del valle de Lluta, hasta Poconchile (Región de Arica y Parinacota). Posteriormente, Philippi-B (1964) lo describe también en la quebrada de Camarones y además en Chusmiza (en la precordillera de Tarapacá). En nuestro conocimiento, el único registro de reproducción de la especie fue realizado por Jaime Amenábar en diciembre de 1966, quien vio adultos de la especie entrando en cavidades en la quebrada de Tana con comida y escuchó pichones piando desde dentro de la cavidad (Johnson 1967). En el norte de Chile es una especie residente, y probablemente se reproduce de forma habitual en el país, pero sus sitios de reproducción dificultan el hallazgo de indicios de reproducción. En el Atlas fue registrado en todos los valles de la Región de Arica y Parinacota, incluyendo zonas cordilleranas, y también en Camiña, Coscaya y Moquella en la Región de Tarapacá.

Se recomienda su búsqueda en el país. De la Peña (2013) describe que los nidos en Argentina se ubican en huecos o grietas en laderas de montaña, en zonas altas. El nido es rudimentario, y los huevos pueden ser puestos directamente sobre las piedras o sobre plumas.

La especie no se encuentra amenazada a nivel global (BirdLife International 2018), aunque en Chile no ha sido evaluado y podría estar declinando (J. Aguirre y F. Medrano obs. pers.). 🌿

