


Chorlo de la puna
Charadrius alticola

Patrich Cerpa


RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

INSTITUTO DE ENTOMOLOGÍA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE)

patrichcm@gmail.com



METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR



El Chorlo de la puna es un ave restringida a la zona altoandina del sur de Perú, oeste de Bolivia, noreste de Chile y noroeste de Argentina (Goodall et al. 1951). Para Chile, Goodall et al. (1946) lo sitúan en la cordillera desde la frontera peruana hasta Antofagasta, encontrándose entre los 3.700 y 5.000 MSNM; Philippi-B (1964) menciona que el límite sur se encuentra en la laguna del Negro Francisco, Región de Atacama; Aguirre (1990) lo menciona para el embalse del Yeso, Región Metropolitana; y Araya y Millie (2000) registran su nidificación allí, sin dar más antecedentes.

En el Atlas se registró en su distribución conocida hasta la Región de Atacama, con un registro más al sur, en la quebrada Calvarito, Región de Coquimbo (L. Ugarte, F. Olivares, R. Condemarín, R. Barraza, N. Mercado, L. Valdivia, M. Olivares en eBird 2015), encontrándose entre los 2.600 y 4.500 MSNM.

Su hábitat corresponde a lagunas y salares altoandinos, de preferencia fangosos (Goodall et al. 1946), existiendo algunos reportes puntuales de individuos errantes en la costa de Chile y Perú (Hughes 1984, Pearson 1974, eBird 2018). Apparently no realiza grandes movimientos altitudinales ni migraciones (Kraaijeveld 2008). Suele forrajear y moverse entre lagunas en pequeños grupos o solitario; siendo su dieta en gran parte desconocida, aunque existen reportes de crustáceos y moscas de la familia Ephydriidae como parte de ella, siendo todos estos registros anecdóticos o puntuales (Hoy 1967, Laredo 1996).

En Argentina, Laredo (1996) reporta volantones en enero, lo mismo hace Salvador (2015) quien registra dos pichones en marzo, y por último Hoy (1980) reporta huevos en febrero. En Chile, Goodall et al. (1951) observaron pollos en enero. El Atlas permitió añadir abundantes datos de esta índole, registrando presencia de volantones desde septiembre a marzo, entre las regiones de Antofagasta y Atacama. Por ende, la reproducción se extendería al menos desde agosto.

Anida en bordes y playas de cuerpos de agua altoandinos, en ocasiones entre coironales, en donde ubica un nido poco elaborado en una depresión en forma de copa directamente en el suelo. Allí pone de dos a tres huevos, los que logran un alto mimetismo con su entorno y sustrato (Hoy 1967, Graves 1981, Aguirre 1987, Salvador 2015).

Van den Hout y Martin (2011) estudiaron el comportamiento repetitivo de inclinación lateral de la cabeza observado en esta especie, el cual permitiría al ave evitar el encandilado solar y a la vez mejorar la visualización de potenciales depredadores aéreos o terrestres mediante dicha postura de la cabeza, siendo por lo tanto una respuesta antidepredatoria. Otra conducta antidepredatoria es que los padres toman las cáscaras de los huevos y las alejan del entorno del nido.

La especie se encuentra categorizada internacionalmente como «PREOCUPACIÓN MENOR» desconociéndose el estado y tendencias de sus poblaciones (BirdLife International 2018). A nivel nacional no cuenta con categoría vigente, ni planes de conservación asociados.