


Pilpilén austral
Hæmatopus leucopodus

Santiago Imberti
ASOCIACIÓN AMBIENTE SUR
santiagoimberti@gmail.com

La *distribución mundial* del Pilpilén austral se restringe a la parte sur de Sudamérica, Patagonia de Argentina y Chile, teniendo además una población residente en las islas Malvinas/Falkland (Housse 1945, Goodall et al. 1951, Woods y Woods 1997, Jaramillo 2003, de la Peña 2015). Durante la temporada reproductiva ocupa desde el norte de Tierra del Fuego, la mayor parte de las provincias de Santa Cruz y el oeste de Chubut en Argentina, mientras que en Chile se extiende desde la Región de Magallanes hasta el sur de la Región de los Lagos. En la época no reproductiva se lo encuentra en las costas de las provincias y regiones mencionados de ambos países, pero además se expande hacia el norte por las costas marinas, llegando al sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina y ocasionalmente hasta el río Biobío en Chile (Escudero et al. 2014). Al respecto, los registros disponibles en eBird (2018) indican que su distribución se extendería hasta la Región de la Araucanía y al menos, ocasionalmente, hasta los alrededores de Talcahuano, como lo indica el mapa de distribución generado con estos datos. El hecho de que su presencia no ha sido reportada para sitios intermedios entre estas localidades extremas de su distribución, probablemente se debe a que son zonas poco prospectadas, más que ambientes poco propicios para la especie.

Nidifica en pastizales húmedos generalmente cercanos a un cuerpo de agua, aunque en ocasiones lo hace en zonas muy secas también, desde las costas marinas (Ferrari et al. 2001) hasta cientos de kilómetros tierra adentro, llegando a la zona de transición de la estepa con el bosque andino, y hasta los 1.000 msnm en las mesetas del oeste de la provincia de Santa Cruz (Imberti 2005³; S. Imberti obs. pers.). Elige una pequeña depresión natural donde coloca pequeñas piedras o materiales blandos y pone dos huevos (Woods y Woods 1997, Escudero et al. 2014, de la Peña 2015). Permanece en sitios de nidificación tierra adentro desde fines de septiembre a principios de enero (Escudero et al. 2014). Durante la temporada no reproductiva migra a las costas marinas, prefiriendo



estuarios y zonas fangosas, donde forma bandadas de miles de individuos, aunque no es tan común en los canales (Albrieu *et al.* 2004, Escudero *et al.* 2014, Imberti 2005^b, eBird 2016). Dado que existen eventos de reproducción en las costas marinas es difícil determinar por las fechas solamente cuando los registros de la costa corresponden a eventos reproductivos o no. En las islas Malvinas/Falkland no forma grandes congregaciones ni parece tener movimientos consistentes a lo largo del año (Woods y Woods 1997). La dieta durante la época reproductiva no ha sido documentada pero probablemente consiste de invertebrados, lombrices y larvas de varios grupos (Escudero *et al.* 2014)

La población mundial del Pilpilén austral se estima entre 46.000–139.000 individuos (Wetlands International 2006), con aproximadamente 25.000–100.000 conformando la población continental y entre 21.000–39.000 en las islas Malvinas/Falkland. Dada su extensa distribución y que las poblaciones se consideran estables se lo considera como fuera de peligro a nivel mundial (BirdLife International 2018). Sin embargo, la especie no está exenta de amenazas, entre ellas se destacan el sobrepastoreo, pisoteo de ganado, la desertificación, explotación y exploración petrolífera en los ambientes donde nidifica y la presión del urbanismo y las actividades petrolíferas y de transporte entre otras en los sitios donde inverna (Ferrari *et al.* 2007, Escudero *et al.* 2014). Sitios como Bahía Lomas, que durante el invierno albergan a una porción considerable de la población mundial con hasta 14.000 individuos registrados (Escudero *et al.* 2014), y algunas otras bahías del Estrecho de Magallanes que albergan bandadas numerosas, debieran recibir especial protección y consideración. 🌿

