Patagón

Ochetorhynchus phœnicurus

Santiago Imberti
ASOCIACIÓN AMBIENTE SUR,
santiagoimberti@gmail.com

Históricamente la distribución del Patagón se extendía de manera uniforme en la estepa patagónica, abarcando desde el sur de la provincia de Mendoza y La Pampa hasta Santa Cruz, Argentina (Ridgely y Tudor 2009, Narosky e Izurieta 2010, de la Peña 2015). Sin embargo, la especie fue descubierta en Chile en tiempos relativamente recientes (Vuilleumier *et al*. 1993, Howell y Webb 1995), aunque su presencia había sido presumida por varios autores con anterioridad (Olrog 1948, Johnson 1967). La nidificación en Chile recién fue confirmada en 1996 (Matus y González 1997, Matus 1998, Matus y Jaramillo 2008) y hasta ese momento todavía había sido considerado endémico de la Argentina. Los primeros registros en Chile correspondían a la zona más oriental del Estrecho de Magallanes (Jaramillo 2003), y luego se confirmó que su distribución se extendía considerablemente hacia el oeste, hasta llegar a la zona de transición con el bosque (R. Matus *com. pers;* S. Imberti *obs. pers.*) donde existe el ambiente de matorral y estepa que la especie favorece. El mapa de este Atlas muestra que las poblaciones conocidas se concentran principalmente en el sector de Sierra Baguales y en el sector entre San Gregorio, Pali Aike y Buque Quemado, entre el nivel del mar y los 1.100 MSNM. La modelación además muestra que en las estepas patagónicas del suroeste de la Región de Aysén se presenta un hábitat potencial para la especie, por lo que debería buscarse en el sector para confirmar la presencia.

Prefiere desde zonas con pastizales o suelos prácticamente desnudos con al menos algunos arbustos, hasta arbustales densos de Mata negra (*Mulguræa tridens*) o en ocasiones de Mata verde (*Lephidophyllum cupressiforme*) y Calafate (*Berberis* spp.), incluyendo zonas de estepa abierta hasta la transición con el bosque andino y desde el nivel del mar hasta los 1.200 MSNM. Se tratan éstos de ambientes escasamente representados en Chile, por lo que su distribución y abundancia está restringida a la estepa magallánica y arbustiva al norte del Estrecho de Magallanes.

Nidifica construyendo una esfera de palos y ramitas, dentro de una Mata negra, un arbusto de Calafate o Mata verde, hasta unos 1,5 m del suelo, que contiene una recámara interior revestida con plumas y otros materiales suaves. Probablemente comienza a nidificar hacia fines de agosto si las condiciones climáticas lo permiten, dado que durante el invierno el Patagón permanece en los mismos ambientes, sin realizar desplazamientos migratorios notables. Deposita de dos a cuatro huevos (de la Peña 2015). Durante el invierno se los observa comúnmente en grupos de 2–5 individuos, aunque se desconoce si estas agrupaciones corresponden a adultos y sus crías de la temporada anterior o tienen otra conformación.

La falta de datos para otoño e invierno en eBird probablemente no signifique que las aves realicen desplazamientos migratorios, si no que refleja la falta de observadores en el área durante esos meses, dado que la especie es residente anual en la vecina provincia de Santa Cruz, Argentina (S. Imberti *obs. pers.*).



