Tijeral común

Leptasthenura ægithaloides

Pamela Espíndola-Hernández
INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD (IEB)
DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY AND EVOLUTIONARY GENETICS, MAX PLANCK INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY.
pespindola@orn.mpg.de

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

El Tijeral común se distribuye desde el sur de Perú (Arequipa) y el oeste de Bolivia (La Paz) hasta Tierra del Fuego (Ridgely y Tudor 2009, Remsen y Bonan 2016). En Chile, Hellmayr (1932) describe tres subespecies: *L. a. ægithaloides* desde la provincia de Coquimbo hasta Ñirehuao (Región de Aysén), *L. a. grisescens* en las zonas no cordilleranas entre el extremo norte de Chile y la provincia de Atacama, y *L. a. berlepschi* en el altiplano de Arica y el altiplano de Antofagasta. Goodall *et al.* (1951) añaden a *L. a. pallida* como una cuarta subespecie presente en el país, en base a pieles colectadas por F. Behn en la cordillera de la Araucanía y una piel colectada por C. Olrog en Ñireguao (Región de Aysén). Johnson (1972) expande la distribución de *ægithaloides* hasta Magallanes. La distribución del Tijeral descrita en este Atlas no distingue entre las subespecies, pero coincide con la distribución acumulada descrita previamente para cada una de ellas.

En cuanto a su distribución altitudinal, Hellmayr (1932) describe a *ægithaloides* desde el nivel del mar a los 2.100 MSNM, *grisescens* hasta los 1.200 MSNM y *berlepschi* hasta los 3.700 MSNM. Por otra parte, Jaramillo (2003) describe a *ægithaloides* entre los 0–2.500 MSNM, *grisescens* entre los 0–1.500 MSNM, a *berlepschi* entre los 2.000–4.000 MSNM y a *pallida* entre los 0–700 MSNM.



El Tijeral común utiliza en general ambientes relativamente abiertos, como bosques abiertos y matorrales (Goodall *et al*. 1946). Las densidades poblacionales varían estacionalmente y según la latitud; se ha estimado entre 0,06–2 aves por hectárea (Estades 1997, González-Gómez *et al*. 2006, Engilis y Kelt 2011). Es insectívoro y forrajea en pequeños grupos, desde parejas hasta bandadas mixtas (Engilis y Kelt 2011).

La temporada reproductiva descrita en literatura varía según la latitud: en el norte de Chile pone huevos en octubre-noviembre, mientras que en la zona centro pone sus huevos en septiembre-octubre (Fjeldså y Krabbe 1990). Además, Hellmayr (1932) añade que puede tener una segunda puesta a fin de diciembre. Nidifica en cavidades secundarias, fabricando una copa dentro de hoyos de árboles, cactus, rocas, construcciones, o nidos abandonados (Remsen y Bonan 2016), y presenta un tamaño de puesta de entre 2–4 huevos blancos (Hellmayr 1932, de la Peña 2013, Remsen y Bonan 2016). Se han reportado algunos nidos activos de Tijeral común dentro de nidos activos de Aguilucho común (*Geranoætus polyosoma*), lo que podría ser una estrategia anti-depredatoria (Cerpa y Medrano 2016). En este Atlas, se encontró que la construcción de nidos comienza a fines de junio y se observaron pichones desde fines de julio a febrero, en la zona centro de Chile, y desde octubre a febrero en la zona norte y la zona sur de Chile.

La especie no se encuentra globalmente amenazada (BirdLife International 2018) y no ha sido clasificada en el país.