


Becacina de la puna

Gallinaga andina

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com



La *Becacina de la puna* se encuentra restringida al altiplano desde el norte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina (del Hoyo et al. 2018). En Chile, Hellmayr (1932) menciona dos subespecies: *andina* en Sacaya (Región de Tarapacá) en base a pieles colectadas por Lane, solo conociéndose en ese sector, y describe la subespecie *innotata*, restringida al río Loa, la cual fue colectada por Sanborn. Posteriormente, Philippi et al. (1944) mencionan en Putre a *andina* (Región de Arica y Parinacota) y Goodall et al. (1951) añaden como localidades para *andina* el salar del Huasco y el río Collacagua (Región de Tarapacá), y el sector de Quillagua (también dentro del río Loa, en la Región de Antofagasta) para *innotata*. Howell y Webb (1995) mencionan la presencia en el Tatío, altiplano de la Región de Antofagasta. La literatura posterior repite esta información. En este Atlas encontramos a esta especie desde el extremo norte de Chile hasta la Región de Coquimbo, pero sin registros en la Región de Atacama (aunque el modelo de hábitat plantea al altiplano de esta región como un área donde su presencia es probable). Esto se condice con registros en otros años en la Vega San Andrés (A. Jaramillo en eBird 2010) y en el sector del Tranque La Ola (F. Medrano en eBird 2018). En el Atlas no se registraron ejemplares en el río Loa.

En cuanto a la distribución altitudinal, Jaramillo (2003) la describe entre los 2.000–5.000 MSNM. En el Atlas lo encontramos entre los 2.500–4.500 MSNM.

Casi no se conocen detalles sobre su reproducción. Goodall et al. (1951) mencionan que un guía local con el que trabajaron les envió un nido con huevos y un pichón de pocos días colectado en septiembre. Por otra parte, del Hoyo et al. (2018) mencionan que la temporada reproductiva en el centro de Perú se desarrolla principalmente entre octubre y diciembre. De forma posterior al periodo de este Atlas se registró un pollo en un sector de bofedales en Misitune, en la RN Las Vicuñas (Región de Arica y Parinacota) a mediados de octubre (F. Díaz, E. Navarro e I. Tejada en eBird 2017). No hay más información, por lo que se debiesen estudiar sus nidos, los cuales se encuentran probablemente en sectores inundados del altiplano como en otras especies del grupo.

del Hoyo et al. (2018) mencionan que podría desplazarse hacia las pampas argentinas en invierno, pero sin más información.

Globalmente no se encuentra amenazada (BirdLife International 2018), aunque no se conocen los tamaños ni tendencias poblacionales. Es necesario realizar prospecciones al altiplano para entender los múltiples aspectos de esta rara y enigmática especie. 🌿

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

