


Gaviota austral
Leucophæus scoresbii

Ricardo Matus

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)


CENTRO DE REHABILITACIÓN
DE AVES LEÑADURA (CRAL)

rmatusun@gmail.com



● COLONIAS HISTÓRICAS: MARÍN *et al.* (1989), ESPINOSA Y VON MEYER (1999)

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR



La *Gaviota austral* se distribuye en ambas costas del extremo sur de Sudamérica e islas Malvinas/Falkland (Harrison 1987). Goodall *et al.* (1951) indican que es regular desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos y raro hasta Talcahuano. Schlatter y Riveros (1987) mencionan que además nidifica en Diego Ramírez. En la costa de Argentina se encuentra desde el sur de la Provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados (Narosky e Izurieta 2003).

La información de este Atlas indica un rango similar al descrito por Goodall *et al.* (1951), extendiendo sin embargo su distribución hasta la isla Santa María (aunque es poco frecuente en el norte de su distribución).

La población global se estima en 10.000 a 28.000 ejemplares (BirdLife International 2018); la mayoría de la población se encuentra en las islas Malvinas/Falkland, de los cuales 5.000–9.000 parejas nidifican en las islas Malvinas/Falkland (Woods y Woods 1997) mientras que se estiman entre 322–2.510 parejas en la costa de Argentina (Yorio *et al.* 1998).

Especie estrictamente marina, aunque en Magallanes incursiona en aguas interiores que utiliza como dormideros (R. Matus *obs. pers.*) o sitios para nidificar (Humphrey *et al.* 1970). A pesar de tratarse de una especie particularmente abundante en la Región de Magallanes, no existen suficientes datos de nidificación en el continente y es probable que parte de las colonias estén ubicadas en islas de los canales patagónicos, un dato aún desconocido. Lo cierto es que las colonias registradas tienen tamaños variables a lo largo de su distribución.

Philippi *et al.* (1954) indican que en una colonia de Tierra del Fuego las aves se encontraban poniendo huevos a principios de noviembre. Los mismos autores mencionan que, ante la perturbación provocada por su presencia en la colonia, algunas de las gaviotas tomaron sus propios huevos para destruirlos a un lado de la colonia. Marín *et al.* (1989) mencionan un sitio en los islotes de Talcahué, en la Región de Los Lagos, con dos nidos y Espinosa y von Meyer (1999) reportan la nidificación en la Isla Doña Sebastiana, Región de Los Lagos; de La Peña (2016) indica que, en Argentina, la nidificación ocurre entre octubre y febrero. Woods y Woods (1997) indican que la nidificación en islas Malvinas/Falkland comienza en diciembre y ponen de 2 a 3 huevos. En el Atlas no se incluye información novedosa al respecto.

Un trabajo de anillamiento realizado en islas Malvinas/Falkland mostró que los juveniles se dispersaron en diferentes direcciones dentro de la isla moviéndose a lo largo de la costa (Woods y Woods 1997).

La colecta de huevos en la zona de los canales podría constituir una amenaza para esta especie, que parece tener colonias de nidificación reducidas en comparación con la Gaviota dominicana (*Larus dominicanus*). Si es que una parte importante de las colonias se encuentran ubicadas en la zona de los fiordos, se podría inferir que el avance del Visón (*Neovison vison*) podría ser una amenaza directa para esta especie. Sin embargo, por ahora se ha clasificado como en «PREOCUPACIÓN MENOR» (BirdLife International 2018). 🌿