Minero común
Geositta cunicularia


Rodrigo Barros
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
barrilo@gmail.com

Ana M. Venegas
AVESCHILE
anacaven@gmail.com

El Minero común se distribuye en el cono sur de Sudamérica, desde el centro de Perú, sureste de Bolivia y sur de Brasil, al sur por Uruguay, Argentina y Chile, llegando hasta Tierra del Fuego. Presenta una importante variación geográfica, con nueve subespecies reconocidas, de las cuales cinco están presentes en Chile (Remsen 2018). Las diferencias vocales de algunas de estas poblaciones sugieren que podría existir más de una especie involucrada (Fjeldså y Krabbe 1990, Jaramillo 2003), lo que ha sido reforzado con estudios genéticos (Cheviron *et al.* 2005).

En Chile está presente la subespecie endémica *fissirostris* desde Vallenar (sur de la Región de Atacama), hasta Carelmapu (Región de los Lagos), presentándose en especial abundancia por el borde costero desde Illapel (Región de Coquimbo) hasta Concepción (Región del Biobío), aunque también se señala para el valle central y hasta las laderas de los primeros contrafuertes cordilleranos (Goodall *et al.* 1946, 1957, Barros 1944), y entre 0–1.000 MSNM (Jaramillo 2003); la subespecie *cunicularia*, en la zona del Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego (Región de Magallanes) y en el este de la Región de Aysén (Goodall *et al.* 1946, 1964), y entre 0–1.000 MSNM (Jaramillo 2003); la subespecie *deserticolor*, en la costa árida desde Arica (Región de Arica y Parinacota) hasta Caldera (Región de Atacama) (Goodall *et al.* 1946), y entre 0–500 MSNM (Jaramillo 2003); la subespecie *titicacæ*, en el altiplano de Parinacota (Región de Arica y Parinacota) (Goodall *et al.* 1946), hasta Antofagasta (Jaramillo 2003) y norte de la cordillera de Atacama (Couve *et al.* 2016), y entre 3.500–4.500 MSNM (Jaramillo 2003); y la subespecie *hellmayri* en los alrededores de Lonquimay, cordillera de la Región de la Araucanía (Araya y Millie 1986).

En el Atlas se reportó la especie en el altiplano de Arica y Parinacota (*titicacæ*), entre los 4.200–4.500 MSNM, sin evidencias de reproducción confirmada; luego, y de manera continua, entre Paposo (sur de Antofagasta) y norte de la isla de Chiloé (*deserticolor- fissirostris*), y entre el nivel del mar y los 2.100 MSNM, aunque el 80% de los registros se ubicó en la zona costera, bajo los 200 MSNM; y en el este de Aysén y Magallanes, hasta el norte y centro de Tierra del Fuego (*cunicularia*), entre los 0–1.000 MSNM.



Se encuentra en una variedad de hábitats abiertos, en terrenos planos o suavemente inclinados, arenosos, con pasto corto o tierra desnuda, a menudo con arbustos y rocas dispersas (Fjeldså y Krabbe 1990, Remsen 2018). En playas o desembocadura de ríos, en dunas escasamente vegetadas (*fissirostris*), estepa patagónica abierta (*cunicularia*), desierto costero, en zonas arenosas abiertas, a veces sin vegetación (*deserticolor*) y planicies arenosas y secas en la puna (*titicacæ*) (Goodall *et al*. 1946, Jaramillo 2003).

Forrajea en el suelo, alimentándose de artrópodos (e.g. dípteros, coleópteros y larvas) y algunas semillas (Remsen 2018). Se le encuentra solo, en parejas o en grupos familiares, observándose bandadas durante la migración. Durante el vuelo nupcial vuela en olas largas bajas sobre el suelo, dando vueltas y balanceándose erráticamente, llegando a 10–15 m de altura y luego descendiendo con las alas abiertas (Fjeldså y Krabbe 1990).

Hellmayr (1932) señala que *fissirostris* se reproduce principalmente en octubre-enero, intentando a menudo dos posturas, una a principios de octubre y la segunda a mediados de diciembre. Goodall *et al*. (1946) señalan nidos con huevos tan temprano como agosto. Para *cunicularia*, Humphrey *et al*. (1970) señalan que en Tierra del Fuego forman parejas y construyen nidos a finales de septiembre, encontrando nidos con pollos hasta noviembre y diciembre. Para *deserticolor*, Goodall *et al*. (1946) encontraron un nido con huevos en septiembre, suponiendo una segunda postura en diciembre, como *fassirostris*. En el Atlas se reportaron para *fissirostris*, despliegues entre julio-noviembre, y alimentación de polluelos entre agosto y principios de enero.

Es presumiblemente monógamo. Nidifica en túneles horizontales de entre 0,4–3,5 m de largo y diámetro de entre 8–10 cm, excavados en laderas de cerros o taludes, pero también aprovecha grietas o huecos a baja altura. El nido lo realiza en una cámara al final del túnel, con relleno de hierbas, pelos, flores, plumas y raicillas, a veces escasamente acolchado. Pone 2–3 huevos blancos de 24 × 19 mm. La incubación y el cuidado de los polluelos es realizado por ambos sexos (de la Peña 2013, Remsen 2018).

Aunque el tamaño de su población no se ha cuantificado, se piensa que se encuentra disminuyendo, aunque no a tasas considerables. Por lo anterior y dado su gran rango de distribución, el Minero común está considerada como una especie de ‹PREOCUPACIÓN MENOR› (BirdLife International 2018).

