Albatros de cabeza gris
Thalassarche chrysostoma

Montserrat Vanerio-Ramírez
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y DE RECURSOS NATURALES
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (UV)
montserrat.vanerio@gmail.com

Raphael Cañoles
ESCUELA DE BIOLOGÍA MARINA,
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y DE RECURSOS NATURALES
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (UV)
rjcanoles@gmail.com



El Albatros de cabeza gris es un ave pelágica con una distribución circumpolar, siendo el albatros mediano (*Thalassarche*) con distribución más meridional. Durante los veranos australes se encuentra en aguas subantárticas y antárticas (46–64°S), mientras que en invierno se ubica entre los 39°-51°S (Murphy 1936, Goodall *et al*. 1951, Harrison 1983, Clark 1986, Brooke 2004).

La población mundial se estima en 98.600 parejas, las cuales anidan en ocho grupos de islas en el hemisferio sur, con las mayores concentraciones en el suroeste de la región Atlántica (Tickell 2000, Poncet *et al*. 2006). Después de las islas Georgias del Sur, en Chile se concentra la segunda población reproductora más importante a nivel mundial (23% ~18.063 parejas), distribuida en dos colonias subantárticas: islas Ildefonso (55°44'S, 69°28'O) e islas Diego Ramírez (56°31'S, 68°43'O) (Schlatter y Riveros 1987, Robertson *et al*. 2007, 2008, 2017).

Se reproduce bienalmente, comenzando a principios de septiembre-octubre cuando los albatros regresan a las colonias (Weimerskirch *et al*. 1986, Cobley *et al*. 1998, Brooke 2004), aunque una pequeña proporción de individuos intentan reproducirse anualmente (en Marion Island y Bird Island). Este comportamiento podría estar relacionado a una menor competencia intraespecífica y/o un suministro de alimento más predecible (Ryan *et al*. 2007).

El retorno a las islas puede comenzar desde los 3 años de vida, con un promedio de 6–7 años. Sin embargo, la primera reproducción no se da sino hasta los 7–12 años (Prince *et al*. 1994, Tickell 2000). La puesta de huevos se realiza de forma relativamente sincronizada, en un periodo de 15–20 días, comenzando en octubre. Al igual que el resto de los *Thalassarche*, elabora un nido que consiste en un montículo de barro, vegetación y raíces, que se ubican generalmente en laderas o acantilados costeros de gran altura (Brooke 2004), formando colonias de 10.000–15.000 parejas. Son aves monógamas y podrían mantener la misma pareja para toda la vida. Cada pareja pone un huevo por temporada, el cual eclosiona en diciembre, y el cuidado parental se extiende hasta abril-mayo, cuando abandonan la isla (Tickell y Pinder 1975, Tickell 2000).

En Diego Ramírez los adultos reproductores emprenden viajes de alimentación de 2.500–12.000 km (Robertson 2000). Su dieta está basada en el consumo de calamares, peces y krill, comúnmente en ese orden de importancia. Pese a que son especies simpátricas con el Albatros de ceja negra (*Thalassarche melanophris*), poseen zonas de forrajeo y preferencias dietarías distintas, siendo el cabeza gris una especie que se alimenta mayoritariamente en zonas pelágicas, por lo que interactuarían en menor grado con las pesquerías del sur de Chile (Croxall *et al*. 1997, Tickell 2000, Arata *et al*. 2004).

Actualmente se encuentra clasificada como ‹EN PELIGRO› (BirdLife International 2018), relacionado principalmente a las tendencias poblaciones en las Georgias del Sur y en las islas Campbell, en donde se ha estimado una disminución del 43% entre 2004–2015, lo que equivale a un descenso proyectado del 85% o incluso superior si la mortalidad continúa al mismo ritmo durante tres generaciones (Poncet *et al*. 2017). En Chile, pese a que se ha observado asociado a actividades pesqueras de palangre demersal y pelágico (Suazo *et al*. 2014), estudios recientes estiman un aumento de la población en Diego Ramírez (Robertson *et al*. 2017) , por lo cual se considera ‹CASI AMENAZADA› (MMA 2018).