
Gallina ciega chica
Systellura decussata

Juan E. Salazar
LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS
UNIVERSIDAD DE CHILE (UCH)
jsasalaz@ug.uchile.cl

La Gallina ciega chica fue considerada hasta hace poco tiempo como la subespecie *decussata* de la Gallina ciega común (*Systellura longirostris*), pero evidencias moleculares (Sigurdsson y Cracraft 2014), además de diferencias en vocalizaciones y rango, han permitido clasificarla como una especie diferente (Remsen *et al*. 2018 – Propuesta SACC 677, Cleere 2010).

La Gallina ciega chica presenta una distribución restringida a las zonas litorales del Perú y el extremo norte de Chile, en un gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar, hasta los 1.300 MSNM (Cleere 2010). Para Chile, Goodall *et al*. (1951) señalan su distribución desde Azapa, provincia de Arica, hasta Quillagua, provincia de Tocopilla, y desde el litoral hasta los 1.000 MSNM, rango repetido por autores posteriores, aunque Fjeldså y Krabbe (1990) la describen llegando hasta los 3.550 MSNM, registro que probablemente corresponda a *C. l. artipunctatus*. El registro más austral conocido para la Gallina ciega chica es en el Parque del Loa, María Elena, provincia de Tocopilla (Región de Antofagasta), 77 km al sur de Quillagua (R. Barros, F. Díaz, A. Minoletti, F. Schmitt y N. Tores *en eBird 2010*).

Los registros del Atlas se enmarcan dentro de la distribución conocida para la especie en Chile, concentrados principalmente en los valles de la provincia de Arica, siendo los registros más al sur en La Huayca y Patache, Región de Tarapacá. Altitudinalmente, se registró la especie desde el borde costero hasta los 1.300 MSNM.



Esta especie se ha descrito como sedentaria, sin migraciones conocidas. Habita en el litoral árido, campos abiertos, bordes de bosques y matorrales, y claros de bosques (Cleere 2010), así como en los valles y oasis desérticos (Jaramillo 2003). Se desconocen sus patrones de alimentación específicos (del Hoyo *et al*. 2018), aunque se presume de hábitos insectívoros nocturnos y crepusculares similares a los descritos para *S. longirostris*.

Casi nada se sabe sobre su biología reproductiva, pero se especula que la temporada sería al menos de noviembre a enero (del Hoyo *et al*. 2018). Johnson (1967) encontró un pollo recién salido del huevo en noviembre en el valle del Lluta, provincia de Arica, por lo que la nidificación comenzaría antes de este mes. Los huevos son blancos, de tamaño 26,9–27,8 mm×19,8–20,4 mm, no existiendo mayor información (del Hoyo *et al*. 2018).

La población de la Gallina ciega chica no ha sido cuantificada a nivel global, pero se estima que sus números poblacionales son estables, clasificándose en la categoría de ‹PREOCUPACIÓN MENOR› (BirdLife International 2018).

