

Jilguero grande


Spinus crassirostris

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES

Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com



El Jilguero grande se encuentra representado por dos subespecies: *S.c. amadoni*, desde la cordillera del centro de Perú, extremo norte de Chile y parte del centro-oeste de Bolivia; y la nominal *S.c. crassirostris*, distribuida desde la cordillera del sur de Bolivia, Argentina y del centro de Chile (Clement 2018). En Chile fue descubierta por Barros (1921) en Ojos de Agua, El Peñon y el valle de Los Leones, en la cuenca del río Aconcagua, Región de Valparaíso. Goodall et al. (1946) aportan como antecedente que también se encuentra en la cuenca del río Maipo, pues Ruth Philippi cazó un ejemplar en Lo Valdés. Johnson (1972) repite esta información, planteando que además a esa fecha no existían registros de *S.c. amadoni* para el país. Jaramillo (2003) es quien menciona a *amadoni* por primera vez para Chile, en la cordillera de Arica. En este Atlas encontramos a *amadoni* en Visviri y Belén, y a *crassirostris* entre Majada, La laguna (Región de Coquimbo) y El Morado (Región Metropolitana).

Jaramillo (2003) la describe entre los 2.000–4.000 MSNM y Ridgely y Tudor (2009) la describen entre los 3.000–4.000 MSNM en la zona norte de su distribución, bajando hasta los 2.100 MSNM en el sur. En este Atlas los registros se encuentran entre los 2.300–3.100 MSNM para *crassirostris*, y entre los 3.700–4.600 MSNM para *amadoni*.

Se conoce muy poco sobre su nidificación. De la Peña (2013) describe que en Argentina encontró un nido con tres huevos en febrero, el cual se encontraba en un arbusto. Este nido era una taza elaborada con fibras vegetales, lanas y plumas. Tapia (2005) menciona la reproducción en la zona central de Chile, habiendo un macho que entraba reiteradamente en una cavidad de una pared de adobe y también observa un volantón. En el Atlas encontramos alimentación de pichones en noviembre en Belén (R. Barros, F. de Groote, D. Davis, E. Sandvig y F. Medrano en eBird 2013). También se han descrito nidos con huevos a fines de febrero en Jujuy, gónadas ampliadas en marzo, y construcción de nido en marzo (Fjeldså y Krabbe 1990), probablemente tras el «invierno boliviano». Por ello, eventualmente existen dos temporadas reproductivas para *amadoni*, aunque *crassirostris* probablemente se reproduzca solo en la primavera austral.

También se ignora sobre sus movimientos post-reproductivos, pero aparentemente deja la cordillera de la zona central en verano (Barros 1921), moviéndose al norte (Fjeldså y Krabbe 1990). Pese a que es una especie escasa, aparentemente no se encuentra amenazada (BirdLife International 2018). 🌿