Tijeral listado

Leptasthenura striata

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com



El Tijeral listado se distribuye por la ladera occidental de los Andes, desde la precordillera del centro de Perú (Ancash) hasta el norte de Chile (Remsen 2018). Su distribución en Chile fue descrita tempranamente por Hellmayr (1932) en la precordillera, desde Putre (Región de Arica y Parinacota) hasta los alrededores de Pica (Región de Tarapacá), y el resto de la literatura repite esta información. En este Atlas se extiende su límite sur hasta el sur de la Región de Tarapacá, siendo el dato más austral la Quebrada Maní (R. Petitpas *en eBird* 2012).

En cuanto a la distribución altitudinal, Jaramillo (2003) lo describe entre los 3.000 – 4.000 MSNM. En este Atlas se encontró generalmente entre los 2.600 – 4.600 MSNM, habiendo sin embargo registros regulares al comienzo de la precordillera, a los 1.400 MSNM (F. Medrano *en eBird* 2017) y a los 5.300 MSNM, en el Volcán Isluga (V. Heuacker *en eBird* 2016).

El Tijeral listado habita el matorral precordillerano árido, que incluye *Baccharis* y otros arbustos compuestos, a veces con cactus y bromelias, y localmente en bosques abiertos de *Polylepis* (Fjeldså y Krabbe 1990). Se alimenta de insectos, pero su dieta y estrategia de alimentación no está descrita en detalle (Remsen 2018).

No existe información sobre la nidificación de la especie (Remsen 2018), aunque se ha observado ingresando en forma persistente en cavidades entre las rocas (F. Medrano *obs. pers.*). En futuras versiones del Atlas se recomienda buscar especialmente indicios de su reproducción.

A nivel global se clasifica como de ‹PREOCUPCIÓN MENOR›, a pesar que el tamaño de la población no se ha cuantificado, la que parece estar disminuyendo (BirdLife International 2018).

