Tórtola

Zenaida auriculata

Patrich Cerpa
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

INSTITUTO DE ENTOMOLOGÍA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE)

patrichcm@gmail.com


La Tórtola es una paloma de tamaño medio, distribuida prácticamente en todo el territorio sudamericano (Gibbs *et al*. 2001). Existirían dos subespecies reconocidas para el país, *hypoleuca y auriculata*, las que se distribuyen desde el extremo norte a Tierra del Fuego. Además existe un tercer taxa, *chrysauchenia*, que podría ser el que se encuentra en las regiones de Aysén y Magallanes.

Goodall *et al*. (1946) la señalan como abundante entre la Región de Coquimbo y la Región de Aysén, siendo ocasional en Atacama y Magallanes (Tierra del Fuego) y Barros (1954) amplía su distribución hasta Arica (Región de Arica y Parinacota). Así, Barros (1968), señala su distribución entre Arica y Tierra del Fuego, y desde la costa hasta los 1.600 MSNM. En el presente Atlas se constató su presencia desde Arica hasta el sur del Estrecho de Magallanes, y desde el nivel del mar hasta los 3.900 MSNM.

Es una especie altamente gregaria, la que se puede ver en grupos forrajeando en diversas zonas abiertas. En ambientes naturales se concentra principalmente en pastizales, matorrales o bosque disperso y se la halla muy abundante en zonas urbanas y especialmente en ambientes agrícolas (Silva-Rodríguez *et al*. 2008). Las poblaciones australes realizan una migración estacional durante el invierno hacía el centro del país, probablemente gatilladas por la disponibilidad de alimento (Gigoux 1932, Hellmayr 1932, Gibbs *et al*. 2001).

Goodall *et al*. (1946) plantean un comienzo de la temporada reproductiva en la zona central entre octubre y noviembre, finalizando en febrero, desplazándose dicho periodo un mes en su distribución más austral. En el presente Atlas, se registró reproducción confirmada para todo el año, concentrándose en las temporadas de primavera y verano.

El despliegue reproductivo del macho consiste en arrullos en una rama expuesta, pudiendo hacer vuelos semicirculares con las plumas del cuello erectas. Durante el cortejo directo a la hembra, este la persigue arrullando y erecta las plumas del cuello mientras aletea. Posteriormente se inclina, indicando un potencial lugar del nido con las plumas del cuello erectas y la cabeza hacia adelante, mientras levanta la cola, la abre en abanico, y arrulla (Gibbs *et al*. 2001). Su nidificación es muy frecuente en parques, plazas y jardines de ciudades, adaptándose bien a las condiciones antrópicas en donde encuentra abundantes semillas (Hudson 1929). Pone dos huevos en un nido plano y sencillo, el cual ubica a poca altura del suelo en ramas de arbustos o árboles (Germain 1860, Hudson 1929). La incubación tiene una duración aproximada de 14 días y los pichones salen del nido de 12 a 15 días tras la eclosión (Hellmayr 1932, Lazo y Anabalón 1992, Gibbs *et al*. 2001).



Forrajea directamente sobre el suelo, siendo confiada en lugares transitados. Su dieta es bastante generalista y se compone principalmente de frutos, semillas y en menor medida de brotes florales, insectos y caracoles (Chachin y Calchi 2007, González-Acuña *et al*. 2017). Este consumo de semillas estaría concentrado en especies exóticas y/o invasoras, y algunas plantas cultivadas (González-Acuña *et al*. 2017).

Sus huevos son depredados por el Tiuque (*Milvago chimango*) (Hudson 1929) y polluelos por el Tucúquere (*Bubo virginianus*). Otra causa del fracaso de la nidada es la perturbación humana (Lazo y Anabalon 1992), y en ambientes urbanos, animales domésticos y roedores. Los parásitos de la especie se encuentran bien estudiados, entre los cuales se hallan endoparásitos como *Killigrewia delafondi, Raillietina* sp., *Echinostoma* sp., *Heterakis gallinarum y Eimeria labbeana*; mientras que los ectoparásitos reportados para la especie son *Falculifer isodontus, Diplægidia columbæ, Amblyomma* sp., *Columbicola baculoides, Bonomiella* sp., *Hohorstiella* sp. y un ácaro de la familia Trombiculidae (Clayton y Price 1999, Gonzalez Acuña *et al*. 2004). Sin embargo, se desconoce el impacto que estos tienen en el éxito reproductivo de la especie.

Se encuentra categorizada internacionalmente como ‹PREOCUPACIÓN MENOR› (BirdLife International 2018). En Chile, posiblemente existió un aumento poblacional como consecuencia del cambio de uso de suelo, ingreso de especies vegetales exóticas y la destrucción del bosque nativo, condiciones y ambientes en donde la especie se desenvuelve exitosamente. A pesar de ser una especie frecuente en ambientes urbanos, es notable la ausencia de trabajos que expliquen dicha adaptación a estos ambientes, como las interacciones con el ensamble de aves que allí se encuentran y las estrategias que permiten su notable plasticidad a los recursos que allí halla. Como indica González-Acuña *et al*. (2017) es relevante conocer el efecto que está teniendo el cambio de uso de suelo en esta especie, así como su interacción con la agricultura y con otras especies de granívoras.

