Tortolita de la puna
Metriopelia aymara


Patrich Cerpa
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
INSTITUTO DE ENTOMOLOGÍA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE)
patrichcm@gmail.com

La Tortolita de la puna se distribuye en la zona andina del centro-sur de Perú, oeste de Bolivia, noroeste de Argentina y noreste de Chile, registrándose ocasionalmente en simpatría, en algunas zonas andinas de menor altitud, con la Tortolita boliviana (*Metriopelia ceciliæ*) (Hellmayr 1932, Goodall *et al*. 1946).

En Chile, Goodall *et al*. (1946) la sitúan desde la alta cordillera de Arica (Región de Arica y Parinacota), hasta Baños del Toro, en la Región de Coquimbo, distribución repetida por autores posteriores (Philippi-B 1964, Araya y Millie 1986, Jaramillo 2003, Martínez y González 2017). En el presente Atlas se repite la distribución conocida, con prácticamente la totalidad de los registros en la zona andina entre Arica y la Región de Atacama, existiendo hábitat apropiado en la Región de Coquimbo, aunque este parece ser sumamente escaso; sin embargo, en Argentina se ha reportado en varias oportunidades hasta la provincia de Mendoza.

Es la tórtola que habita a mayor altitud de Chile: Hellmayr (1932) la describe hasta los 3.800 MSNM, Budin (1931) la presenta hasta los 5.000 MSNM por el lado argentino, y Goodall *et al*. (1946) la señalan a los 4.350 MSNM en la cordillera de Arica. En el Atlas se registró entre los 1.400 – 4.600 MSNM, aunque generalmente estuvo sobre los 3.500 MSNM.

Se la encuentra siempre sobre el suelo en pastizales, vegas, matorrales o áreas abierta altoandinas, en parejas o grupos pequeños en búsqueda de alimento (Gibbs *et al*. 2001, Tellería *et al*. 2006, Josens *et al*. 2017). En ocasiones se la puede observar posada sobre rocas que sobresalen de la superficie, pero es de difícil detección en general gracias a su sobria coloración, además de vocalizar de forma excepcional (Tubaro y Mahler 1998, Areta y Monteleone 2011). La alimentación tanto de adultos como polluelos se basa mayoritariamente en semillas, las cuales muele con piedrecillas presentes en el buche, adicionando gramíneas a su dieta en menor medida (Zotta 1932, Gibbs 2001, Salvador 2015).



Su periodo de reproducción en Chile se desconoce con precisión, sin embargo, Goodall *et al*. (1946) registran nidos con huevos en Tarapacá el abril, explicando que dicha fecha tan tardía podría conseguir evitar las lluvias que se presentan en enero y febrero en la región; mientras Philippi (1941) menciona que nidifica en febrero. En este Atlas se obtuvo reproducción confirmada solo en la zona andina de la Región de Tarapacá con nidos con huevos y pichones en abril y noviembre respectivamente (I. Vásquez *en eBird 2012*), por lo que parece probable que la especie tenga al menos dos reproducciones por año.

El nido es una copa abierta construida principalmente de gramíneas de hoja dura, tallos y detritos, situado directamente sobre el suelo, pero protegido en salientes rocosas, entre rocas, grietas, o construcciones de adobe; en éste deposita dos huevos de color blanco, cuyos periodos de incubación y crecimiento de polluelos permanecen desconocidos (Budin 1931, Philippi 1941, Goodall *et al*. 1946, Roe y Rees 1979, Gibbs *et al*. 2001, Salvador 2015).

Sus interacciones interespecíficas se encuentran pobremente abordadas, registrándose a la fecha el piojo *Columbicola altamimiae* (Phthiraptera:Philopteridae) en ejemplares de Chile y Bolivia (Clayton y Price 1999, Adams *et al*. 2005).

Internacionalmente se encuentra categorizada como de ‹PREOCUPACIÓN MENOR› por la IUCN, por no tener indicaciones de declinación de sus poblaciones (BirdLife International 2018). Siendo una de las especies que habita a mayor altitud en Chile, se vuelve un excelente modelo para el estudio comparativo de adaptaciones de índole fisiológico, como tasas metabólicas, respiración y crecimiento. Ámbitos tan básicos como su biología reproductiva, conducta, interacciones y dieta se encuentran profundamente desatendidas, siendo una de las especies de tórtolas menos estudiadas.

