Cazamoscas de pico chato
Myiophobus fasciatus

Rodrigo Barros
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
barrilo@gmail.com



El Cazamoscas de pico chato presenta una amplia distribución en Sudamérica, reconociéndose varias subespecies. La raza *rufescens* se distribuye por la costa oeste de Perú, desde Lambayeque hacia el sur, hasta el extremo norte de Chile (Farnsworth *et al*. 2018). Jaramillo (2003) sugiere que *rufescens* debería considerarse una especie separada por sus diferencias vocales y de plumaje, lo que ha sido asumido recientemente por algunos autores (Farnsworth *et al*. 2018, Howell y Schmitt 2018).

Para Chile, Goodall *et al*. (1951) informan del primer espécimen capturado en 1949 por Behn en Poconchile, valle de Lluta, ampliando Marín *et al*. (1989) su distribución hacia el sur hasta el valle de Camarones. Autores posteriores repiten esta distribución restringida a los valles de la provincia de Arica, desde el nivel del mar hasta los 500 MSNM, donde es una especie poco común (Jaramillo 2003). Los datos del Atlas son coherentes con la distribución conocida para la especie en el país, con registros entre el nivel del mar y los 1.000 MSNM.

Habita los oasis de los valles desérticos, con presencia de arbustos nativos altos, viviendo al interior del follaje denso, especialmente en Chilca (*Baccharis petiolata*) (Jaramillo 2003, Martínez y González 2017).

No existe información sobre la reproducción de la subespecie *rufescens* (Farnsworth *et al*. 2018). Martínez y González (2017) dan cuanta de adultos alimentando jóvenes en primavera, así como grupos familiares en el valle de Lluta. En el Atlas no se informó ningún dato de reproducción confirmada.

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

