

Churrete austral

Cinclodes antarcticus

André Vielma
ONG TARUKARI
avielmam@gmail.com





El Churrete austral tiene dos subespecies reconocidas: *antarcticus* en las islas Malvinas/Falkland, y *maculirostris* en las islas del extremo sur de Chile y Argentina, las que son tratadas como especies separadas por algunos autores (del Hoyo *et al.* 2018, Remsen y Kirwan 2018). En Chile *maculirostris* se encuentra en las islas al sur del canal Beagle, archipiélago de las Wollaston (Goodall *et al.* 1946), península Brecknock (Venegas y Jory 1979) y en las islas Diego Ramírez (Pisano 1972). También en la isla Dawson (Goodall *et al.* 1957), isla Noir e islas Ildefonso (Kusch *et al.* 2007). Los registros obtenidos en el Atlas son concordantes con la distribución conocida para la especie en los canales patagónicos y fueguinos del extremo austral.

Habita playas rocosas costeras, especialmente en las cercanías de colonias de mamíferos marinos y aves marinas, alimentándose principalmente de artrópodos e invertebrados, los que extrae de restos de algas en las playas, de nidos y excrementos de aves, y alrededor de mamíferos varados (del Hoyo *et al.* 2018).

No se conoce prácticamente nada de la reproducción de *maculirostris*, aunque presumiblemente es similar a la de *antarcticus* en las islas Malvinas/Falkland, donde se han registrado posturas entre octubre-enero, y polluelos entre noviembre-enero (Remsen y Kirwan 2018). En las islas del cabo de Hornos se informó de un nido con crías a mediados de diciembre (del Hoyo *et al.* 2018), mientras que en el archipiélago Diego Ramírez se capturaron hembras reproductivamente activas durante enero (Cursach *et al.* 2012[b]). Los únicos datos de reproducción que se generaron en el Atlas señalan cortejo, despliegue o cópula en noviembre en isla Hornos (F. Schmitt *en eBird 2015*) y nido ocupado en octubre en la isla Bartolomé (V. Raimilla *en eBird 2011*).

En las islas Malvinas/Falkland, *antarcticus* nidifica en túneles ubicados en taludes sobre playas, o bien entre rocas y peñascos, incluso en construcciones humanas. El nido lo construye con hierbas, raíces y plumas. La postura usualmente es de 2–3 huevos, los que incuba durante 16 días, siendo el cuidado biparental (Remsen y Kirwan 2018). Para el Cabo de Hornos, un nido ubicado en una grieta o túnel correspondía a una plataforma de pasto y plumas, con tres huevos blancos (del Hoyo *et al.* 2018).

Actualmente se encuentra clasificado como ‹CASI AMENAZADO›, ya que su distribución es muy restringida, presenta una población que aparentemente está disminuyendo y su habitual conducta mansa lo hace vulnerable a mamíferos introducidos, como gatos y ratas (del Hoyo *et al.* 2018). Se ha demostrado que la erradicación de mamíferos introducidos como ratas, facilita la recolonización del Churrete austral (Poncet *et al.* 2011) y que la presencia de ratas restringe considerablemente las densidades de esta especie (Tabak *et al.* 2014).