

Churrete de alas blancas

Cinclodes atacamensis

André Vielma
ONG TARUKARI
avielmam@gmail.com





El Churrete de alas blancas se distribuye en la puna en los Andes, desde Perú y Bolivia, hasta Chile central, además de Argentina, principalmente en el noroeste (Remsen 2018). En Chile, Goodall *et al*. (1946) lo sitúan desde el extremo norte hasta Baños del Toro, Región de Coquimbo, ampliando Johnson (1967) su distribución sur hasta la cordillera de Santiago, donde aparece ocasionalmente (Vielma y Medrano 2015). Goodall *et. al* (1946) lo señalan siempre para alturas mayores de 3.000 MSNM, y Jaramillo (2003) entre los 2.500–5.000 MSNM.

El mapa del Atlas es concordante con la distribución conocida para la especie, con una mayor probabilidad de ocurrencia en el altiplano de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se presentan las condiciones climáticas y vegetacionales más características de la puna, como praderas de altura, disminuyendo su probabilidad de ocurrencia hacia la Región de Atacama, y en menor grado hasta la Región Metropolitana. Los datos del Atlas muestran que se reproduce en zonas altas desde los 2.000 MSNM, con mayor frecuencia de registros entre los 3.800–4.600 MSNM. Existen pocos registros de reproducción entre el sur de la Región de Antofagasta y la Región de Atacama.

Su hábitat son principalmente praderas en zonas altas de los Andes y laderas rocosas o arbustivas, generalmente cerca de cursos de agua (Remsen 2018). Se ha descrito como muy numeroso a grandes altitudes, mientras que a mediana altitud es superado en número por *Cinclodes albiventris* (Goodall *et al*. 1946).

En Chile y Argentina la postura de huevos es en noviembre, con pichones en noviembre-diciembre, y en el sur de Perú se reportan pichones en octubre y volantones en noviembre-diciembre (Remsen 2018). En el Atlas se reportaron nidos con pichones en agosto-octubre y alimentación de volantones entre noviembre-enero.

El nido se construye con hierbas secas, pelos y plumas, en cámaras o túneles emplazados en laderas, acantilados, o construcciones humanas (Goodall *et al*. 1946, de la Peña 2013, Remsen 2018). El tamaño de puesta es en promedio de 2 huevos (Goodall *et al*. 1946, Remsen 2018), sin información sobre el rango de variación de la postura.

Si bien es cierto no se encuentra amenazado, se recomienda proteger áreas húmedas con disponibilidad de cavidades dentro de su zona de distribución.