Colegial del norte
Lessonia oreas

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

El Colegial del norte se distribuye en el altiplano del sur de Perú, Bolivia, y el norte de Chile y Argentina (Farnsworth y Lebbin 2018). En Chile fue descrita por Hellmayr (1932) entre la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y de Atacama, aunque incluyendo zonas bajas como el sector de Leoncito en Atacama (probablemente en invierno). Goodall *et al*. (1946) expanden esta distribución a Baños del Toro, en la cordillera de la Región de Coquimbo, distribución repetida por la literatura posterior. En este Atlas obtuvimos información principalmente entre la cordillera de la Región de Arica y Parinacota y la Región de Atacama, y solo marginalmente para la Región de Coquimbo en el sector de Espejo de agua (C. Vallejo y L. Valdivia *en eBird 2015*).

En cuanto a la distribución altitudinal, Goodall *et al*. (1946) lo describieron entre los 1.000–4.200 MSNM; Jaramillo (2003) lo describe entre los 3.500–4.500 MSNM; y en el Atlas lo encontramos entre los 2.300–4.600 MSNM, concentrándose los registros entre los 3.600–4.500 MSNM.

En su distribución utiliza pantanos, vegas y orillas de río (Goodall *et al*. 1946). En estos sitios, construye nidos elaborados con pastos y otras fibras vegetales escondidos en la vegetación de los pantanos, en los cuales pone 3 huevos (Goodall *et al*. 1946).

Existe poca información sobre su biología reproductiva, pero en la temporada del Atlas se encontraron adultos alimentando pichones en febrero. Su vuelo de despliegue es descrito en detalle por Areta y Miller (2014). No hay más información.

Sería interesante que en próximas versiones del Atlas se pueda dilucidar el estatus de esta especie dentro de la Región de Coquimbo, y que se incorporen datos de historia natural en eBird que permitan analizar de mejor forma la biología reproductiva de esta especie.

No se encuentra globalmente amenazado, pero no existe información sobre sus tamaños y tendencias poblacionales (BirdLife International 2018).



