Golondrina bermeja
Hirundo rustica

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

La Golondrina bermeja es una especie migradora regular, que llega a Chile y Argentina en la primavera austral y permanece durante el verano (Turner 2018). Ocasionalmente algunos ejemplares se quedan durante el invierno, particularmente en el norte del país (Marín 1999). Esta especie nidifica principalmente en el hemisferio norte (Turner y Christie 2012), aunque existen pequeñas colonias de nidificación descubiertas en Argentina (Martínez 1983), cuyas poblaciones reproductivas parecen estar en expansión (Idoeta *et al*. 2011, Larracochea *et al*. 2012). En Chile, Albert (1899) reporta por única vez la reproducción de esta especie en las cercanías de la Laguna de Aculeo (Región Metropolitana), lo que es desacreditado por Hellmayr (1932). Por otra parte, el 2013 se vió un ejemplar de esta golondrina entrando de forma repetitiva a una cavidad en la quebrada de Chaca (Región de Arica y Parinacota) (F. Medrano *en eBird 2013*) a 3,5 metros del suelo. En este contexto, es importante tener presente la posibilidad de que esta especie pueda reproducirse en Chile, siguiendo la estrategia novedosa que está ocurriendo con poblaciones argentinas.

Golondrina peruana
Progne murphyi

Rodrigo Barros
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
barrilo@gmail.com

La Golondrina peruana es una especie poco común que se encuentra restringida a la costa de Perú, desde el norte de Piura hacia el sur, hasta el extremo norte de Chile, habitando entre los 0–1.500 MSNM (Luo 2010). En Chile, Jaramillo (2003) la señala como regular en los valles del Lluta y Azapa (Región de Arica y Parinacota), encontrándose en pequeños números junto a otras golondrinas. Registros de «golondrinas negras» en el Salar de Surire, Región de Arica y Parinacota (Mussa y Tala 1996), en Fuerte Baquedano, Región de Tarapacá (González 1988) y en Mejillones, Región de Antofagasta (Mussa y Tala 1996, Marín 2004) se han atribuido a esta especie (Marín 2004, Martínez y González 2017), aunque no se puede descartar Golondrina negra (*Progne elegans*) o Golondrina purpúrea (*Progne subis*), las que son especies muy migradoras y semejantes en plumaje. En eBird (2018) se ha registrado solo en los valles del Lluta y Azapa, entre los 0–1.000 MSNM, solitaria o en grupos de hasta 12 ejemplares, siendo una especie regular pero escasa.

Hasta la fecha no se han reportado nidos activos para la especie, pero se sospecha que nidifica en las grietas de muros de piedra en algunas islas guaneras al norte de Perú, los mismos sitios que ocupan como colonias-dormidero, los que comparten con la Golondrina de mar peruana (*Oceanodroma tethys*) (Balta *et al*. 2005, Valverde-Romero *et al*. 2007). Se supone que los sitios de nidificación naturales serían grietas en acantilados (Luo 2010). Schulenberg *et al*. (2007) plantean que los registros más al sur podrían corresponder a migrantes no reproductivos, o bien a poblaciones reproductoras donde los sitios de reproducción aún no han sido descubiertos. En ese contexto, la presencia de la especie durante todo el año en los valles de Arica (eBird 2018), sugiere que potencialmente podría reproducirse en Chile.

Su estado de conservación es clasificado como ‹VULNERABLE›, con una población pequeña (estimada entre 2.500–9.999 individuos) y en disminución. Se requieren estudios que permitan precisar el tamaño de su población, las tendencias y distribución, además de su ecología general, con especial énfasis en determinar los requisitos de sus sitios de nidificación, para así poder comprender las amenazas potenciales a la que se ve enfrentada la especie (BirdLife International 2018).