
Pájaro plomo

Phrygilus unicolor

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com

El Pájaro plomo se encuentra a través de toda la Cordillera de los Andes, desde Santa Marta, en Colombia, hasta Tierra del Fuego (Ridgely y Tudor 2005). En Chile, Hellmayr (1932) lo describió entre el extremo norte y el Estrecho de Magallanes, distribución a la que se añade Tierra del Fuego por Goodall *et al*. (1946). La literatura posterior sigue esta distribución. Sin embargo, Couve *et al*. (2017) añaden una población en los valles del sur de la Región de Atacama, y Martínez y González (2017) añaden a la Región Metropolitana en su totalidad, incluyendo parte de la Cordillera de la Costa de la Región de Valparaíso y de O'Higgins. En el Atlas se corrobora la distribución de Goodall *et al*. (1946), pero no se obtuvieron registros en la costa de la Región de Atacama ni en las de Valparaíso y O'Higgins, habiendo sin embargo poblaciones en Altos de Chicauma y Altos de Cantillana.

En cuanto a su distribución altitudinal, Hellmayr (1932) lo describe entre los 1.800–4.600 MSNM; posteriormente Housse (1945) amplía su distribución hasta los 1.500 MSNM; Goodall *et al*. (1946) menciona que solo nidifica sobre los 2.500 MSNM; Jaramillo (2018) amplía la distribución hasta los 500 MSNM, precisando que esto aplica para el sur de su distribución, en Patagonia, y que llegaría hasta los 5.000 MSNM en el altiplano. Finalmente, Couve *et al*. (2016) agregan que puede llegar al nivel del mar en invierno. En este Atlas se corrobora lo planteado por Couve *et al*. (2016), añadiendo que todos los registros bajo los 900 MSNM se encuentran solo en las regiones de Aysén y Magallanes. Por otra parte, los registros más altos se realizaron en el Parque Nacional Lauca, a 4.700 MSNM (N. Senner *en eBird* 2012). Estos registros se encuentran concentrados entre los 1.800–3.000 MSNM y los 4.200–4.800 MSNM, correspondiendo a la estepa altoandina del altiplano y de la zona central del país.



Utiliza ambientes de matorral andino. En detalle, en la Reserva Nacional Ñuble se encuentra asociado al matorral semi-deciduo de *Colletia hystrix*, *Colletia argentina*, *Diostea juncea* y *Fabiana imbricata* (Estades 1997), mientras que en el altiplano utiliza lugares con *Espeletia* sp. (Fjeldså y Krabbe 1990).

A pesar de su amplio rango, la información sobre su reproducción es escasa. Puede nidificar en arbustos o dentro de cavidades de farellones rocosos, donde construye una copa con gramíneas, ramitas, líquenes y raicillas, incluyendo fibras animales (Dinelli 1924, Goodall *et al*. 1946, Salvador y Narosky 1984). En su nido pone 2–3 huevos (Salvador y Narosky 1984). No existe información sobre la duración de la incubación ni de la crianza. La temporada reproductiva aparentemente depende de la temporalidad de los recursos y de las condiciones meteorológicas de los sitios donde habita. Así, se reproduce entre noviembre y enero en Chile central, cuando las gramíneas y los insectos de ciclo anual germinan (Jaramillo 2018, datos de este Atlas). Lo mismo ocurriría en el centro de Argentina (Salvador y Narosky 1984). Sin embargo, en el norte de Argentina y en Perú la nidificación se extendería entre enero y julio, tras el «invierno boliviano» (Dinelli 1924, Jaramillo 2018), y en Colombia nidifica entre julio y octubre (Jaramillo 2018).

No hay detalles sobre su dieta, pero se alimenta de granos e insectos (Housse 1945). Tampoco existe información sobre las especies que podrían depredarlo. En Argentina, sus nidos pueden ser parasitados por el Mirlo común (*Molothrus bonariensis*) (Friedmann 1934, Salvador y Bodrati 2011). Su población es abundante, por lo que no presenta amenazas.

